

SEMNELE DE PERICOL PENTRU VIAȚA COPILULUI MIC

Copilul Dumneavoastră se află în pericol și necesită ajutor medical imediat, dacă are cel puțin unul din următoarele simptome:

- 1) Respiră greu (geme, gâfâie, are sunete neobișnuite la inspirație/expirație, șuierătoare) și frecvent chiar și în stare de repaus, tușește, are bătăi ale aripilor nazale în timpul respirației;
- 2) Refuză pieptul, orice altă mâncare sau să bea lichide, refuză să mănânce de mai mult de 6 ore;
- 3) Vomită după fiecare alăptare, alimentare sau după ce bea lichide;
- 4) Are diaree;
- 5) Este mai puțin activ ca de obicei, doarme mai mult ca de obicei sau este letargic (nu poate fi trezit), ochii înfundați;
- 6) Țipă de durere, este neliniștit, excitat, devine brusc palid sau se învinețește la față;
- 7) Are febră peste 38.0C sau hipotermie (este rece);
- 8) Are convulsii (contractii involuntare ale mușchilor);
- 9) I s-a înroșit ombilicul (buricul) sau plaga (rana) ombilicală are eliminări .

SEMNELE DE PERICOL PENTRU VIAȚA COPILULUI MIC

Copilul Dumneavoastră se află în pericol și necesită ajutor medical imediat, dacă are cel puțin unul din următoarele simptome:

- 1) Respiră greu (geme, gâfâie, are sunete neobișnuite la inspirație/expirație, șuierătoare) și frecvent chiar și în stare de repaus, tușește, are bătăi ale aripilor nazale în timpul respirației;
- 2) Refuză pieptul, orice altă mâncare sau să bea lichide, refuză să mănânce de mai mult de 6 ore;
- 3) Vomită după fiecare alăptare, alimentare sau după ce bea lichide;
- 4) Are diaree;
- 5) Este mai puțin activ ca de obicei, doarme mai mult ca de obicei sau este letargic (nu poate fi trezit), ochii înfundați;
- 6) Țipă de durere, este neliniștit, excitat, devine brusc palid sau se învinețește la față;
- 7) Are febră peste 38.0C sau hipotermie (este rece);
- 8) Are convulsii (contractii involuntare ale mușchilor);
- 9) I s-a înroșit ombilicul (buricul) sau plaga (rana) ombilicală are eliminări .