



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	P-0197/2025
din	25.03.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

K-Othrine SC 25

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

2022 Environmental Science FR SAS, Franța, Auvergne-Rhone-Alpes, 1 place Giovanni da Verrazzano, 69009

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS; Bayer AG; Bayer S.A.S Bayer CorpScience; SBM Formulation; 2022 ES Discovery India Private Limited (Saraswati) / Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd.; Rallis India Limited; Sayona Crop Care; Phyteurop S.A.; 1, place Giovanni Da Verrazzano Lyon 69009, Franța; Industriepark Höchst (Gebäu de K 607) 6526 Frankfurt, Germania; Industrial operation 1, Avenue Edouard Herriot F-69400 Villefranche-Limas, Franța; Manufacturing Plant ZI Avenue Jean Foucault CS621, 34500 Beziers, Franța; Lane No. 2, Phase 1, SIDCO Industrial Complex District Samba, Jammu, Jammu & Kashmir; 181133 Bari Brahmana, India; PLOT NO C-44, CHEMICAL ZONE, GIDC DAHEJ, TAL. VAGRA, DIST. BHARUCH 392130 GUJARAT, INDIA; Plot 140/3, GIDC Estate

IV. Date de identificare a produsului

1. Categorie de produs	biocid
1.1. Grupa principală	3
1.2. Tip de produs	18

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.20 s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau **comercializat și utilizat** în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.


Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 25.03.2030.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director

Nicolae Jelamschi





Anexa
la certificatul nr. P-0197/2025 din 25.03.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova				
K-Othrine SC 25				
V. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului				
<i>Denumirea chimică(IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea de produs</i>	
Deltamethrin	258-256-6	52918-63-5	2,427 %	
VI. Forma de condiționare				
lichid				
VII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)				
flacon (HDPE) de la 25 ml pana la 20 L				
VIII. Domeniul și aria de utilizare				
1. Domeniul de utilizare		Produse de combatere a dăunătorilor. Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode.		
2. Aria de aplicare		Insecticid. În interiorul clădirilor (locuințe, spații comerciale și industriale).		
IX. Eficacitatea				
<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Insecticida prin contact si ingestie	Metoda standard pentru determinarea eficacității în condiții de laborator, conform EPA OPPTS 810.3000 (General Considerations for Efficacy of Invertebral Control Agents)	Aedea aegypty, Musca domestica, Rhizopertha dominica, Culex quinquefasciatus, Lasioderma serricorne	2.56 % g/g	Bun control al infestarii (mortalitate 100%) la aplicarea a 6.25 si 12.5 mg/m2. Efect rezidual 90 z
Insecticida prin contact si ingestie	Metoda standard pentru determinarea eficacității în condiții de laborator, conform EPA OPPTS 810.3000 (General Considerations for Efficacy of Invertebral Control Agents).	Cimex lectularius, Blatella germanica, Periplaneta americana	2.56 % g/g	Bun control al infestarii la aplicarea a6.25 si 12.5 mg/m2. Efect rezidual 91 zile.
Insecticida prin contact si ingestie	Metoda standard pentru determinarea eficacității în condiții de laborator, conform EPA OPPTS 810.3000	Sitophilus oryzae, Tribolium castaneum	2.56 % g/g	Control bun al infestarii la 6.25 si 12.5 mg/m2. Control rezidual scazut
Insecticida prin contact si ingestie	Metoda standard pentru	Lasius niger	2.56 % g/g	Mortalitate 91% la aplicarea a 10

	determinarea eficacității în condiții de laborator, conform EPA OPPTS 810.3000			mg/m2, efect rezidual 44 zile
Insecticida prin contact și ingestie	Metoda standard pentru determinarea eficacității în condiții de laborator, conform EPA OPPTS 810.3000	Ctenocephalides felis	2.56 % g/g	Mortalitate 100% în 24 ore la aplicarea 114 mg/m2

X. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
prin pulverizare	50 ml diluat la 5 litri pentru 100 m2 (12.5 mg/m2). Pentru infestări localizate se utilizează soluție 25 ml la 5 l pentru 100 m2 (6.25 mg/m2).	Efectul durează câteva săptămâni.

XI. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	

XII. Categoria de utilizatori

Profesionali, Industriali,

XIII. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

Se utilizează conform instrucțiunii.