



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail: [office@ansp.gov.md](mailto:office@ansp.gov.md) IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

|     |             |
|-----|-------------|
| Nr. | P-0197/2025 |
| din | 25.03.2025  |

**I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova**

K-Othrine SC 25

**II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)**

2022 Environmental Science FR SAS, Franța, Auvergne-Rhone-Alpes, 1 place Giovanni da Verrazzano, 69009

**III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)**

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS; Bayer AG; Bayer S.A.S Bayer CorpScience; SBM Formulation; 2022 ES Discovery India Private Limited (Saraswati) / Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd.; Rallis India Limited; Sayona Crop Care; Phyteurop S.A.; 1, place Giovanni Da Verrazzano Lyon 69009, Franța; Industriepark Höchst (Gebäu de K 607) 6526 Frankfurt, Germania; Industrial operation 1, Avenue Edouard Herriot F-69400 Villefranche-Limas, Franța; Manufacturing Plant ZI Avenue Jean Foucault CS621, 34500 Beziers, Franța; Lane No. 2, Phase 1, SIDCO Industrial Complex District Samba, Jammu, Jammu & Kashmir; 181133 Bari Brahmana, India; PLOT NO C-44, CHEMICAL ZONE, GIDC DAHEJ, TAL. VAGRA, DIST. BHARUCH 392130 GUJARAT, INDIA; Plot 140/3, GIDC Estate

**IV. Date de identificare a produsului**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Categorie de produs | biocid |
| 1.1. Grupa principală  | 3      |
| 1.2. Tip de produs     | 18     |

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.20 s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau **comercializat și utilizat** în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.


**Certificatul de înregistrare este valabil până la data: 25.03.2030.**

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

**Director**

**Nicolae Jelamschi**





**Anexa**  
**la certificatul nr. P-0197/2025 din 25.03.2025 pentru înregistrare de stat a**  
**produsului biocid**

|                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova</b> |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                     |
| K-Othrine SC 25                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                     |
| <b>V. Date privind substanța(e) activă(e) a produsului</b>       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                     |
| Denumirea chimică(IUPAC, ISO sau alte)                           | Nr. CE                                                                                                                                                                     | Nr. CAS                                                                                                   | Cantitatea de produs |                                                                                                     |
| Deltamethrin                                                     | 258-256-6                                                                                                                                                                  | 52918-63-5                                                                                                | 2,427 %              |                                                                                                     |
| <b>VI. Forma de condiționare</b>                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                     |
| lichid                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                     |
| <b>VII. Modul de ambalare</b> (tipul, capacitatea)               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                     |
| flacon (HDPE) de la 25 ml pana la 20 L                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                     |
| <b>VIII. Domeniul și aria de utilizare</b>                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                     |
| <b>1. Domeniul de utilizare</b>                                  |                                                                                                                                                                            | Produse de combatere a dăunătorilor. Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode. |                      |                                                                                                     |
| <b>2. Aria de aplicare</b>                                       |                                                                                                                                                                            | Insecticid. În interiorul clădirilor (locuințe, spații comerciale și industriale).                        |                      |                                                                                                     |
| <b>IX. Eficacitatea</b>                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                      |                                                                                                     |
| Activitatea                                                      | Metoda de testare/protocolul de testare                                                                                                                                    | Specia/tulpina                                                                                            | Concentrații         | Timp de acțiune                                                                                     |
| Insecticida prin contact si ingestie                             | Metoda standard pentru determinarea eficacității în condiții de laborator, conform EPA OPPTS 810.3000 (General Considerations for Efficacy of Invertebral Control Agents)  | Aedea aegypty, Musca domestica, Rhizopertha dominica, Culex quinquefasciatus, Lasioderma serricorne       | 2.56 % g/g           | Bun control al infestarii (mortalitate 100%) la aplicarea a 6.25 si 12.5 mg/m2. Efect rezidual 90 z |
| Insecticida prin contact si ingestie                             | Metoda standard pentru determinarea eficacității în condiții de laborator, conform EPA OPPTS 810.3000 (General Considerations for Efficacy of Invertebral Control Agents). | Cimex lectularius, Blatella germanica, Periplaneta americana                                              | 2.56 % g/g           | Bun control al infestarii la aplicarea a6.25 si 12.5 mg/m2. Efect rezidual 91 zile.                 |
| Insecticida prin contact si ingestie                             | Metoda standard pentru determinarea eficacității în condiții de laborator, conform EPA OPPTS 810.3000                                                                      | Sitophilus oryzae, Tribolium castaneum                                                                    | 2.56 % g/g           | Control bun al infestarii la 6.25 si 12.5 mg/m2. Control rezidual scazut                            |
| Insecticida prin contact si ingestie                             | Metoda standard pentru                                                                                                                                                     | Lasius niger                                                                                              | 2.56 % g/g           | Mortalitate 91% la aplicarea a 10                                                                   |

|                                      |                                                                                                       |                       |            |                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|                                      | determinarea eficacității în condiții de laborator, conform EPA OPPTS 810.3000                        |                       |            | mg/m <sup>2</sup> , efect rezidual 44 zile                    |
| Insecticida prin contact și ingestie | Metoda standard pentru determinarea eficacității în condiții de laborator, conform EPA OPPTS 810.3000 | Ctenocephalides felis | 2.56 % g/g | Mortalitate 100% în 24 ore la aplicarea 114 mg/m <sup>2</sup> |

#### **X. Indicații de utilizare**

| <i>Metoda de aplicare</i> | <i>Concentrația soluției de lucru</i>                                                                                                                                                            | <i>Timpul de acțiune</i>          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| prin pulverizare          | 50 ml diluat la 5 litri pentru 100 m <sup>2</sup> (12.5 mg/m <sup>2</sup> ). Pentru infestări localizate se utilizează soluție 25 ml la 5 l pentru 100 m <sup>2</sup> (6.25 mg/m <sup>2</sup> ). | Efectul durează câteva săptămâni. |

#### **XI. Etichetarea produsului biocid**

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Simboluri și indicarea pericolelor                  |  |
| Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)  |  |
| Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P) |  |

#### **XII. Categoria de utilizatori**

Profesionali, Industriali,

#### **XIII. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu**

Se utilizează conform instrucțiunii.