



## Soluții pentru nutriție enterală Nutricomp®

Soluții enterale complete, cu  
compoziție nutrițională variată, pentru  
administrarea orală sau pe sondă.

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE



# Soluțiile de nutriție enterală

## Nutricomp® 500 ml și Nutricomp Drink® 200 ml

Formule complete din punct de vedere nutrițional, conținând macronutrienți esențiali, vitamine și minerale, ce pot fi utilizate ca unică sursă de hrană sau ca suplimente nutriționale la pacienții cu risc de malnutriție, în pregătirea pre-operatorie și în recuperarea post-operatorie a pacienților oncologici.

	Produs	Energie totală (kcal/ml)	Proteine (g)*	Lipide (g)*	MCT (% din total lipide)	Ulei de pește (mg)	Carbohidrați (g)*	Fibre (g)*	Osmolaritate (mOsm/l)	
Soluții enterale pentru administrarea pe sondă – 500 ml	Diete standard	Nutricomp® Standard Neutral	1.0	3.8	3.3	15%	50	14	0	200
		Nutricomp® Standard Fibre Neutral	1.04	3.8	3.3	15%	80	14	1.5	260
		Nutricomp® Energy Neutral	1.5	6	5	52%	50	20	< 0.1	375
		Nutricomp® Energy HP Neutral	1.5	7.5	5	52%	210	19	0	345
		Nutricomp® D Neutral	1.03	4.1	3.5		180	12	2.1	215
	Diete speciale	Nutricomp® Peptid (aromă: mentă)	1.0	3.8	1.3	43%	0	18	0.27	320
		Nutricomp® Glutamine Plus	1.36	6.7	3.7	41%	80	18	1.4	380
		Nutricomp® Hepa Chocolate	1.32	4	5.8	50%	0	16	0.56	395
		Nutricomp® Intensive Neutral	1.3	6.5	5.8	52%	0	13	<0.1	335
Soluții enterale orale – 200 ml	Diete standard	Nutricomp® Drink Plus	1.5	6	5	până la 15.2%	50	20	<0.1	470 – vanilie Et ciocolată 455 – banane 505 – căpșuni
		Nutricomp® Drink Soup	1.5	6	5	până la 50%	210	19	2	440 – legume 425 – pui
		Nutricomp® Drink 2.0 kcal Fibre	2.0	9	8	15%	80	21	2.5	620 – cireșe 590 – ciocolată-praline
	Diete speciale	Nutricomp® Drink Renal	2.0	7	9.6		38	21	1.7	430
		Nutricomp® Drink D	1.03	4.1	3.5		180	12	2.1	220

\*pentru 100 ml

Datorită compozițiilor complexe, soluțiile Nutricomp® 500 ml și Nutricomp® Drink 200 ml:


- au efect anti-inflamator și de susținere a sistemului imunitar;
- îmbunătățesc prognosticul pacienților supuși tratamentelor chimioterapeutice prin creșterea apetitului, a greutateii corporale și a masei musculare;
- susțin pregătirea pre-operatorie a pacienților malnutriți;
- au o toleranță intestinală bună și o absorbție crescută.



# Recomandări privind inițierea nutriției enterale\*

## Administrare continuă

- Absorbție bună a nutrienților, toleranță digestivă bună, risc de diaree redus.
- Inițierea se face în ritm lent și constant, asigurat de o pompă de nutriție.
- Sunt necesare întreruperi pentru acidifierea stomacului (profilaxia împotriva colonizării bacteriene), măsurarea reziduurilor gastrice și reducerea riscului de aspirație.
- Pauzele se sincronizează cu alte manevre de îngrijire (mobilizare, igienă).
- Se verifică volumul și aspectul rezidului gastric de 4-6 ori/zi.



Înainte de administrare, citiți indicațiile de utilizare prezente pe etichetă.

Ziua	Debit administrare max. (ml/h)	Doza max./zi	Întreruperi/zi	
			Pacient critic	Pacient stabil
1	20	500 ml	4 – 6 a câte 30 min.	minim 2 a câte 30 min.
2	40	1000 ml		
3	60	1500 ml		
4	80	2000 ml		

## Administrare în bolusuri



- Se realizează cu seringă sau cu ajutorul unei pompe, asigurându-se un ritm lent de maxim 20 ml/min pentru a evita distensia bruscă a stomacului și implicit vărsătura.
- Cantitatea de alimente introdusă la o masă trebuie raportată la greutatea pacientului (de obicei nu mai mult de 300 ml la un adult).
- Începerea nutriției enterale în bolusuri se face treptat.
- Se verifică volumul și aspectul rezidului gastric de 4-6 ori/zi și la cel puțin o oră după alimentație. Rezidul gastric nu trebuie să depășească 150 ml.

Înainte de administrare, citiți indicațiile de utilizare prezente pe etichetă.

Ziua	Doze/zi
1	6 x 50-70 ml
2	6 x 100 ml
3	6 x 200 ml
4	6 x 300 ml



## Indicațiile produselor Nutricomp®

	Nutricomp® Standard Neutral	Pentru pacienții cu nevoi energetice moderate: tulburări de masticație sau deglutiție, comă, cașexie, anorexie, malnutriție, convalescență, pierderea apetitului, în special pentru pacienții cu contraindicații la fibre.
	Nutricomp® Standard Fibre Neutral	Pentru pacienții cu nevoi energetice moderate și tulburări de tranzit: tulburări de masticație sau deglutiție, comă, cașexie, anorexie, malnutriție, convalescență, pierderea apetitului.
	Nutricomp® Energy Neutral	Pentru pacienții cu malnutriție severă, cu necesități energetice crescute și/sau restricții de fluide și contraindicații la fibre.
	Nutricomp® Energy HP Neutral	Pentru pacienții cu necesar energetic și proteic crescut și/sau cu restricții de fluide: boli cronice catabolice (cancer, fibroză chistică, HIV/SIDA), insuficiență cardio-pulmonară, decubit prelungit, intervenții chirurgicale.
	Nutricomp® D Neutral	Pentru pacienții cu tulburări ale metabolismului glucidic, rezistență la insulină, diabet zaharat sau hiperglicemie de stres, pacienții geriatrici și psihiatrici.
	Nutricomp® Peptid (aromă: mentă)	Pentru pacienții cu malabsorbție și maldigestie: boli inflamatorii intestinale cronice, sindrom de intestin scurt, insuficiență pancreatică, enterite, pacienții critici sau aflați după nutriție parenterală de lungă durată.
	Nutricomp® Glutamine Plus	Pentru pacienții cu stres metabolic și funcție imunitară afectată, cancer, boli infecțioase cronice (sepsis) și boli inflamatorii, post-operator.
	Nutricomp® Hepa Chocolate	Pentru pacienții decompensați hepatic (steatoze alcoolice, ciroze, insuficiență hepatică, post-transplant).
	Nutricomp® Intensive Neutral	Pentru pacienții cu traumatisme, insuficiență respiratorie, intervenții chirurgicale, sepsis, arsuri.
	Nutricomp® Drink Plus (vanilie, ciocolată, banană, căpșuni)	Pentru pacienții cu nevoi energetice crescute cu indicație în pregătirea pre-operatorie a pacienților malnutriți / cu risc de malnutriție și cu contraindicație la fibre, sindrom de intestin scurt, disfgaii, fistule intestinale.
	Nutricomp® Drink Soup (supă de legume, supă de pui cu aromă de curry)	Pentru pacienții cu nevoi energetice crescute cu indicație în pregătirea pre-operatorie a pacienților malnutriți / cu risc de malnutriție, pentru menținerea tranzitului și funcției intestinale normale, boli inflamatorii intestinale, pentru pacienții care nu tolerează gustul dulce al celorlalte variante "de băut".
	Nutricomp® Drink 2.0 kcal Fibre (cireșe, ciocolată- praline)	Pentru pacienții cu nevoi energetice foarte crescute cu indicație în pregătirea pre-operatorie a pacienților malnutriți / cu risc de malnutriție și cu restricție de fluide (edeme, HTA, etc), fistule intestinale, disfgaii.
	Nutricomp® Drink Renal (vanilie)	Pentru pacienții malnutriți / cu risc de malnutriție cu insuficiență renală cronică hemodializați, pentru menținerea tranzitului și funcției intestinale normale, patologii cu necesar energetic crescut, dar cu restricții de fluide și electroliți, ciroze.
	Nutricomp® Drink D (vanilie)	Pentru pacienții malnutriți / cu risc de malnutriție cu tulburări ale metabolismului glucidic, diabet zaharat, hiperglicemie, pentru menținerea tranzitului și funcției intestinale normale.

Alimente destinate unor scopuri medicale speciale. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale produselor.

### B. Braun România

București  
S-Park, clădirea B3, etaj 2,  
Str. Tipografilor 11-15, Sect. 1, București, 013714  
Tel.: +40 21 231 1537 | Fax: +40 21 231 15 36  
www.magazin-bbraun.ro | www.bbraun.ro | contact.ro@bbraun.com | https://www.facebook.com/bbraunRO/

Sânandrei  
Str. Bernd Braun, nr. 1,  
Jud. Timiș, 307375  
Tel.: +40 256 284 905 | Fax: +40 256 284 907

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE