

Specificații tehnice (F.4.1)

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1612516562562

Denumirea procedurii de achiziție: Produse lactate pentru copii primului an de viață

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea comercială, Producător și țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	7	8
	Lotul 1. Produse lactate pentru sugari și copii mici (0-6 luni)				
	Produse lactate pentru sugari și copii mici (0-6 luni)	Formula de lapte-praf instant de început „Nestogen 1”, NESTLE, Rusia	Compoziția esențială - Indicații (HG RM nr. 338 din 11 mai 2011 și nr. 516 din 27.04.2016): Energie 250 – 295 kJ (60 – 70 kcal)/100ml; Proteine - 0,45 - 0,7 g/100 kJ (1,8 – 3,5/100kcal); L-caritină - Minimum 0,3 mg/100 kJ (1,2mg/100kcal); Taurina - 0 - 2,9mg/100kJ (0 - 12mg/100kcal); Colina - 1,7 -12 mg/100kJ (7-50mg/100kcal); Lipide - 1,05 - 1,4g/100kJ (4,4 – 6,0g/100kcal); se interzice utilizarea umătoarelor substanțe: ulei din semințe de susan, ulei din semințe de bumbac, acid lauric și acid miristic maximum – separat sau împreună, 20 % din conținutul total de grăsimi, conținutul de izomeri trans al acizilor grași nu trebuie să fie mai mare de 3 % din conținutul total de grăsimi, conținutul de acid erucic nu trebuie să fie mai mare de 1 % din conținutul total de grăsimi, acid linoleic (sub formă de gliceride = linoleați): 70 mg – 285 mg/100kJ (300 mg – 1200 mg/100kcal); conținutul de acid alfa-linolenic trebuie să fie de: Raportul acid linoleic:acid alfa-linolenic trebuie să fie: cel puțin 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal) de cel puțin 5, dar nu trebuie să depășească 15; se pot adăuga acizi grași polinesaturați (AGP) cu catene lungi de 20 și 22 atomi de carbon - în acest caz, conținutul lor nu trebuie să depășească 1 % din conținutul total de grăsimi pentru AGP n-3; și 2 % din conținutul total de grăsimi pentru AGP n-6/11 % elicosapentaenol (20:5 n-3) nu trebuie să depășească conținutul de acid docosahexaenol (22:6 n-3); conținutul de acid docosahexaenol (22:6 n-3) nu trebuie să depășească pe cel de 40mg/100kcal); Carbohidrați: 2,2 - 3,4g/100kJ (9 - 14g/100kcal); Lactoză Minimum 1,1g/100kJ (4,5/100kcal); Glucoza pe bază de hidrolizate proteice 0,0-0,5g/100kJ (0-2g/100kcal); Amidon preferat în mod natural, fără gluten și/sau amidon gelatinizat în mod natural fără gluten - Maximum 2g/100 ml și 30% din conținutul total de carbohidrați; GOS/FOS - GOS și FOS pot fi adăugate, dar nu trebuie să depășească 0,8g/100ml în combinație de 50% oligosacarozil-lactoză și de 10% oligosacarozil-zaharoză cu greutate moleculară mare; Substanțe minerale: Formulele de început pe bază de proteine din lapte de vacă, hidrolizate proteice sau lapte de capră. Sodiu (mg) 5 - 14/100kJ (20 - 60/100kcal); Calciu (mg) 15 - 38/100kJ (60 - 160/100kcal); Clor (mg) 12 - 38/100kJ (50 - 160/100kcal); Magneziu (mg) 1,2 - 3,6/100kJ (5 - 15/100kcal); Fosfor (mg) 6 - 22/100kJ (25 - 90/100kcal); Zinc (mg) 0,12 - 0,36/100kJ (0,5 - 1,5/100kcal); Fier (mg) 0,07 - 0,3/100kJ (0,3 - 1,3/100kcal); Iod (μg) 0,25 - 12/100kJ (10 - 50/100kcal); Cupru (μg) 8,4 - 25/100kJ (35 - 100/100kcal); Mangan (μg) 0,25 - 25/100kJ (1 - 100/100kcal); Fluorură (μg) 0,25 - 2,2/100kJ (1 - 9/100kcal); Ritonolavina (μg) 19 - 95/100kJ (80 - 400/100kcal); Niacină (μg) 72 - 375/100kJ (300 - 1500/100kcal); Acid pantotenic (μg) 95 - 475/100kJ (400 - 2000/100kcal); Vit. B6 (μg) 9 - 42/100kJ (35 - 175/100kcal); Biotină (μg) 0,4 - 1,8/100kJ (1,5 - 7,5/100kcal); Acid folic (μg)	Descrierea detaliată conform ANEXEI.	HG nr. 338 din 11 mai 2011 și HG nr.516 din 27.04.2016

15511700-0

ANEXA:

Nr.	Compoziția esențială - Indicatorii (HG RM.nr.338/2011 și HG RM.nr.516/2016)	Nestogen 1
1	Energie	281 kJ/100 ml (67 kcal/100 ml)
2	Proteine	0,477 g/100kJ (2 g/100 kcal)
3	L-carnitine	0,427 mg/100kJ (1,79mg/100kcal)
4	Taurina	1,57 mg/100 kJ (6,57 mg/100 kcal)
5	Colina	3,1 mg/100 kJ (12,99 mg/100 kcal)
a	Lipide	1,17 g/100 kJ (4,93 g/100 kcal)
b	Produsul propus nu va contine: ulei din seminte de susan, ulei din seminte de bumbac	nu sunt
c	acid lauric si acid miristic - maximum - separat sau impreuna:	4,6% si 5,5%
d	continutul de izomeri trans ai acizilor grasi	2,4%
e	continutul de acid erucic	0,2%
f	acid linoleic (sub forma de gliceride = linoleati)	194,66 mg/100 kJ (816,42 mg/100 kcal)
	continutul de acid alfa-linolenic	23,13 mg/100 kJ (97,01 mg/100 kcal)
g	Raportul acid linoleic/acid alfa-linolenic	8,42
h	Se admite adaugarea acizilor grasi polinesaturati (AGP) cu catene lungi de 20 si 22 atomi de carbon. In acest caz, continutul lor nu trebuie sa depaseasca:	nu sunt
i	continutul de acid eicosapentaenoic (20:5 n-3)	nu sunt
6	continutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3)	nu sunt
7	Fosfolipide	nu sunt
8	Inozitol	2,85 mg/100 kJ (11,94 mg/100 kcal)
a	Carbohidrati	2,78 g/100 kJ (11,64 g/100 kcal)
	Se admit doar urmatoarii carbohidrati:	
	maltoza	nu sunt
	zaharoza	nu sunt
	glucoza	nu sunt
	maltodextrine	0,78gKJ(3,27g/100kcal)
	sirop de glucoza sau sirop de glucoza deshidratat	nu sunt
	amidon prefiert in mod natural fara gluten	nu sunt
b	amidon gelatinizat	nu sunt
c	lactoza	2,01 g/100 kJ (8,45 g/100 kcal)
9	amidon prefiert si/sau gelatinizat	nu contine
10	Fructooligozaharide si galactooligozaharide	continutul GOS și FOS , în combinație de 90% oligogalactozil-lactoză și de 10% oligofructozil-zaharoză cu greutate moleculară mare. GOS și FOS-0,253 g/100ml
	Substante minerale:	
	Sodiu (mg)	9,96 mg/100 kJ (41,79 mg/100 kcal)
	Potasiu (mg)	27,76 mg/100 kJ (116,42 mg/100 kcal)
	Clorura (mg)	15,66 mg/100 kJ (65,67 mg/100 kcal)
	Calciu (mg)	18,75 mg/100 kJ (78,66 mg/100 kcal)
	Fosfor (mg)	11,39 mg/100 kJ (47,76 mg/100 kcal)
	Magneziu (mg)	1,99 mg/100 kJ (7,96 mg/100 kcal)
	Zinc (mg)	0,27 mg/100 kJ (1,12 mg/100 kcal)
	Cupru (μg)	17,79 μg/100 kJ (74,63 μg/100 kcal)
	Iod (μg)	4,98 μg/100 kJ (20,9 μg/100 kcal)
	Seleniu (μg)	0,71 μg/100 kJ (2,99 μg/100 kcal)
	Mangan (μg)	6,41 μg/100 kJ (26,87 μg/100 kcal)
	Fluorura (μg)	2,81 μg/100 kJ, (11,79 μg/100 kcal)
11	Raportul calciu/fosfor	1,64618086
	Vitamine	
	Vitamina A (μg-RE)	28 μg/100 kJ (117,4 μg/100 kcal)
	Vitamina D (μg)	0,33 μg/100 kJ (1,39 μg/100 kcal)
	Tiamina (μg) -B1	24,91 μg/100 kJ (104,48 μg/100 kcal)
	Riboflavina (μg) -B2	35,59 μg/100 kJ (149,25 μg/100 kcal)
	Niacina (μg)	199,29 μg/100 kJ (835.82 μg/100 kcal)
	Acid pantotenic (μg)	167,26 μg/100 kJ (701,49 μg/100 kcal)
	Vitamina B6 (μg)	14,23 μg/100 kJ (59,7 μg/100 kcal)
	Biotina (μg)	0,68 μg/100 kJ (2,84 μg/100 kcal)

	Acid folic (µg)	3,56 µg/100 kJ (14,93 µg/100 kcal)
	Vitamina B12 (µg)	0,06 µg/100 kJ (0,25 µg/100 kcal)
	Vitamina C (mg)	4,73 mg/100 kJ (19,85 mg/100 kcal)
	Vitamina K (µg)	1,96 µg/100 kJ (8,21 µg/100 kcal)
12	Vitamina E (mg a-TE)	0,33 mg/100 kJ (1,39 mg/100 kcal)
	Nucleotide	
	Citidina 5'-monofosfat	nu sunt
	Uridin 5'-monofosfat	nu sunt
	Adenozina 5'-monofosfat	nu sunt
	Guanozina 5'-monofosfat	nu sunt
	Inozina 5'-monofosfat	nu sunt
	total nucleotide	nu sunt
1	Compoziția esențială - Indicatorii (HG RM.nr.338/2011 și HG RM.nr.516/2016)	Nestogen 2
2	Energie	274 kJ/100 ml (65,5 kcal/100 ml)
3	Proteine	0,504 g/kJ (2,06 g/100 kcal)
4	Taurina	maximum 1,62 mg/100 kJ (6.61 mg/100 kcal)
a	Lipide	1,09 g/100 kJ (4,48 g/100 kcal)
b	Produsul propus nu va contine: ulei din seminte de susan, ulei din seminte de bumbac	nu sunt
c	acid lauric și acid miristic - maximum - separat sau impreuna:	4,6% și 5,5%
d	continutul de izomeri trans ai acizilor grasi	2,4%
e	continutul de acid erucic	0,2%
f	acid linoleic (sub forma de gliceride = linoleati)	167,93 mg/100 kJ (702,59 mg/100 kcal)
	continutul de acid alfa-linolenic	19,74 mg/100 kJ (82,59 mg/100 kcal)
g	Raportul acid linoleic/acid alfa-linolenic	8,5
h	Se admite adaugarea acizilor grasi polinesaturati (AGP) cu catene lungi de 20 si 22 atomi de carbon. In acest caz, continutul lor nu trebuie sa depaseasca:	nu sunt
i	continutul de acid eicosapentaenoic (20:5 n-3)	nu sunt
5	continutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3)	nu sunt
6	Fosfolipide	nu sunt
7	Inozitol	2,52 mg/100 kJ (10,3 mg/100 kcal)
a	Carbohidrati	3,1 g/100 kJ (12,69 g/100 kcal)
	Se admit doar urmatorii carbohidrati:	
	maltoza	nu contine
	zaharoza	nu contine(Nu are proteina hidrolizata)
	glucoza	nu contine(nu are proteina hidrolizata)
	maltodextrine	1,09 g/100 kJ (4,48 g/100 kcal)
	sirop de glucoza sau sirop de glucoza deshidratat	nu contine
	amidon prefiert in mod natural fara gluten	nu contine
b	amidon gelatinizat	nu contine
8	lactoza	1,82 g/100 kJ (7,46 g/100 kcal)
9	Fructooligozaharide si galactooligozaharide	continutul GOS și FOS , în combinație de 90% oligogalactozil-lactoză și de 10% oligofructozil-zaharoză cu greutate moleculară mare. GOS și FOS-0,24 g/100ml
	Substante minerale:	
	Sodiu (mg)	10,58 mg/100 kJ (43,28 mg/100 kcal)
	Potasiu (mg)	32,08 mg/100 kJ (131,19 mg/100 kcal)
	Clorura (mg)	17,45 mg/100 kJ (71,34 mg/100 kcal)
	Calciu (mg)	26,79 mg/100 kJ (109,5 mg/100 kcal)
	Fosfor (mg)	14,89mg/100 kJ (60,9 mg/100 kcal)
	Magneziu (mg)	2,02 mg/100 kJ (8,27 mg/100 kcal)

	Zinc (mg)	0,26 mg/100 kJ (1,04 mg/100 kcal)
	Cupru (µg)	18,25 µg/100 kJ (76,63 µg/100 kcal)
	Iod (µg)	6,57 µg/100 kJ (26,87 µg/100 kcal)
	Seleniu (µg)	0,46 µg/100 kJ (1,87 µg/100 kcal)
	Mangan (µg)	3,28 µg/100 kJ (13,43 µg/100 kcal)
	Fluorura (µg)	2,99 µg/100 kJ (12,24 µg/100 kcal)
10	Raportul calciu/fosfor	1,799/19409
	Vitamine	
	Vitamina A (µg-RE)	29,82 µg/100 kJ (121,94 µg/100 kcal)
	Vitamina D (µg)	0,44 µg/100 kJ (1,79 µg/100 kcal)
	Tiamina (µg)	47,45 µg/100 kJ (194,03 µg/100 kcal)
	Riboflavina (µg)	62,04,38 µg/100 kJ (253,73 µg/100 kcal)
	Niacina (µg)	218,98 µg/100 kJ (895,52 µg/100 kcal)
	Acid pantotenic (µg)	277,37 µg/100 kJ (1134,33 µg/100 kcal)
	Vitamina B6 (µg)	25,55 µg/100 kJ (104,48 µg/100 kcal)
	Biotina (µg)	0,91 µg/100 kJ (3,73 µg/100 kcal)
	Acid folic (µg)	6,06 µg/100 kJ (24,78 µg/100 kcal)
	Vitamina B12 (µg)	0,08 µg/100 kJ (0,31 µg/100 kcal)
	Vitamina C (mg)	4,56 mg/100 kJ (18,66 mg/100 kcal)
	Vitamina K (µg)	2,26 µg/100 kJ (9,25 µg/100 kcal)
11	Vitamina E (mg a-TE)	0,43 mg/100 kJ (1,78 mg/100 kcal)
	Citidina 5'-monofosfat	nu sunt
	Uridin 5'-monofosfat	nu sunt
	Adenozina 5'-monofosfat	nu sunt
	Guanozina 5'-monofosfat	nu sunt
	Inozina 5'-monofosfat	nu sunt
	total nucleotide	nu sunt

Alimentația ideală pentru copii este laptele matern
Informație doar pentru personalul medical

Cunoscutul produs NESTOGEN®

în ambalaj nou



Lactobacteriile L.Reuteri

- formarea scaunului moale
- lipsa regurgitărilor, colicelor și a constipațiilor

Predominarea proteinei din zer*

- formarea scaunului moale
- digestie ușoară

Complexul de prebiotice PREBIO® (GOS/FOS = 90/10)

- formarea scaunului moale
- profilaxia constipațiilor

Raportul optim Ca:P

- formarea scaunului moale
- îmbunătățirea absorbției de calciu

NOTĂ IMPORTANTĂ

O alimentație optimă pentru mame și copii în primele 1000 de zile este fundamentală pentru sănătatea acestora pe tot parcursul vieții. Considerăm că cea mai bună alimentație pentru copil este alăptarea. Laptele matern oferă depozit de nutrienți, necesari pentru o sarcină sănătoasă, precum și pentru pregătirea pentru inițierea și menținerea alăptării. Este dificil de a reveni la alăptare după ce renunțăm la aceasta. Este o acțiune ce are consecințe sociale și financiare. Inițierea nerezonabilă a alimentării parțiale cu lapte formulă sau cu alte produse alimentare și băuturi afectează negativ alăptarea. Dacă mama decide să nu alăpteze, este important de a-i aduce la cunoștință motivele expuse mai sus și de a o instrui cum să pregătească corect amestecul, punând accentul mai ales pe faptul că apa nefiartă, sticlă nesterilizată sau diluarea necorespunzătoare a amestecului pot duce la îmbolnăvirea copilului. După 6 luni, este necesar să se introducă alimente complementare corespunzătoare, continuându-se alăptarea (sau, atunci când alăptarea nu este posibilă, folosindu-se înlocuitori corespunzători) până la doi ani sau mai mult. Deoarece copiii cresc în mod diferit, lucrătorii medicali ar trebui să ofere părinților informații cu privire la momentul potrivit pentru a iniția introducerea alimentelor complementare. Nestogen® 3 și Nestogen® 4 nu constituie un înlocuitor pentru laptele matern și este creat în mod special pentru a răspunde necesităților nutritive în continuă schimbare ale copiilor sănătoși cu vârsta mai mare de 1/1,5 ani.

*Nestogen1

Таблица пищевой ценности

Пищевая ценность	Единицы	На 100 г сухого порошка	На 100 мл готовой смеси	Минеральные вещества			
Калорийность/	ккал/	502,2/	67/	Зола	г	2,6	0,35
Энергетическая ценность	кДж	2103	281	Натрий	мг	210	28
Белки (казеин)/ белки	г	10,07	1,34	Калий	мг	585	78
молочной сыворотки: 40/60)				Хлориды	мг	330	44
Таурин	мг	33	4,4	Кальций	мг	395	52,7
Жиры (в том числе молочные,	г	24,9	3,3	Фосфор	мг	240	32
массовая доля мол. жира 47 %)				Магний	мг	40,5	5,4
Линолевая кислота	мг	4100	547	Железо	мг	5,0	0,67
(16,5% от суммы ж. к.)				Медь	мг	0,36	0,05
α-Линоленовая кислота	мг	490	65	Цинк	мг	5,6	0,75
Докозагексаеновая кислота (DHA)	мг	22,5	3,0	Йод	мкг	105	14,0
Углеводы	г	58,5	7,8	Марганец	мкг	135	18
Лактоза (72,5 % от общего	г	42,4	5,66	Селен	мкг	15	2,0
числа углеводов)				Фтор	мкг	<60	<8
Мальтодекстрин	г	16,4	2,19	Витамины			
Пребиотики (ГОС/ФОС) в т. ч.	г	1,9	0,253	Витамин А	мкг экв. ретинола	590	78,7
галактоолигосахариды	г	1,71	0,228	Витамин Д	мкг	7,0	0,93
фруктоолигосахариды	г	0,19	0,025	Витамин Е	мг экв. токоферола	7,0	0,93
				Витамин К	мкг	41	5,5
				Витамин С	мг	100	13,3
				Витамин В1	мг	0,55	0,07
				Витамин В2	мг	0,95	0,1
				Ниацин	мг	4,2	0,56
				Витамин В6	мг	0,33	0,04
				Фолиевая кислота	мкг	75	10
				Пантотеновая кислота	мг	3,5	0,47
				Витамин В12	мкг	1,3	0,17
				Биотин	мкг	14	1,9
				Холин	мг	65	8,7
				Инозит	мг	60	8,0
				L-Карнитин	мг	9	1,2
				Лютеин	мг	0,08	0,01
				Нуклеотиды	мг	15	2,0
				Основаемость	мОсм/г	247	
				Лактобактерии L.Reuteri	КОЕ/г	не менее $1,0 \times 10^6$	

СУХАЯ АДАПТИРОВАННАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ МОМЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ «NESTOGEN® 1» С ОМЕГА-3 ПНЖК И ЛАКТОБАКТЕРИЯМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ ДО 12 МЕСЯЦЕВ.

Состав: обезжиренное молоко, деминерализованная молочная сыворотка, лактоза, мальтодекстрин, смесь растительных масел (низкоэруковое рапсовое, подсолнечное, подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое), молочный жир, пребиотики (галактоолигосахариды (ГОС) и фруктоолигосахариды (ФОС)), цитрат кальция, эмульгатор (соевый лецитин), цитрат калия, цитрат натрия, фосфат калия, хлорид магния, витаминный комплекс (С (L-аскорбат натрия), Е (DL-альфа-токоферола ацетат), РР (никотинамид), пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция), В1 (тиамина мононитрат), А (ретинола ацетат), В6 (пиридоксин гидрохлорид), В2 (рибофлавин), фолиевая кислота (В9), К (фитоменадион), D-биотин (В7), Д (D3 холекальциферол), В12 (цианокобаламин)), хлорид калия, хлорид натрия, рыбий жир, культура лактобактерий L.Reuteri (не менее $1,0 \times 10^6$ КОЕ/г), таурин, инозит, сульфат железа, сульфат цинка, нуклеотиды, L-карнитин, сульфат меди, сульфат марганца, йодид калия, лютеин, селенат натрия. Упаковано в модифицированной атмосфере с азотом.

СУХАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ АДАПТИ- РОВАННАЯ МОЛОЧНАЯ СМЕСЬ МО- МЕНТАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ «NESTOGEN® 2» С ОМЕГА-3 ПНЖК И ЛАКТОБАКТЕРИЯМИ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 6 МЕСЯЦЕВ.

Состав: обезжиренное молоко, сыворотка молочная деминерализованная, мальтодекстрин, смесь растительных масел (низкоолеиновое рапсовое, подсолнечное, подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое), молочный жир, пребиотики (галактоолигосахариды (ГОС) и фруктоолигосахариды (ФОС)), цитрат кальция, эмульгатор (соевый лецитин), цитрат натрия, хлорид калия, фосфат калия, витаминный комплекс (L-аскорбат натрия (С), DL-альфа-токоферола ацетат (Е), пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция), никотинамид (РР), тиамин моноксид (В1), ретинола ацетат (А), пиридоксин гидрохлорид (В6), рибофлавин (В2), фолиевая кислота (В9), фитоменадион (К), D-биотин (В7), D3 холекальциферол (Д), цианокобаламин (В12)), рыбий жир, культура лактобактерий *L.Reuteri* (не менее 1,0x10⁶ КОЕ/г), цитрат магния, цитрат калия, таурин, сульфат железа, сульфат цинка, нуклеотиды, сульфат меди, йодид калия, лютеин, селенат натрия. Упаковано в модифицированной атмосфере с азотом.

Таблица пищевой ценности

Пищевая ценность	Единицы	На 100 г сухого порошка	На 100 мл готовой смеси	Минеральные вещества			
Калорийность/	ккал/	484/	67/	Золы	г	3	0,4
Энергетическая ценность	кДж	2026	274	Натрий	мг	210	29
Белки (казеин/ белки	г	10,0	1,38	Калий	мг	635	87,9
молочной сыворотки: 60/40)				Хлориды	мг	345	47,8
Таурин	мг	32	4,43	Кальций	мг	530	73,4
Жиры (в том числе молочные,	г	21,6	3,0	Фосфор	мг	295	40,8
массовая доля мол. жира 46 %)				Магний	мг	40	5,54
Линолевая кислота	мг	3600	498	Железо	мг	7	0,97
α-Линоленовая кислота		440	61	Медь	мг	0,36	0,05
Докозагексаеновая	мг	22	3,05	Цинк	мг	5,3	0,7
кислота (DHA)	мг			Йод	мкг	130	18
Углеводы	г	61,5	8,5	Марганец	мкг	65	9,0
Лактоза (58,6 % от общего	г	36	5	Селен	мкг	9,0	1,25
числа углеводов)				Фтор	мкг	<60	<8,3
Мальтодекстрин	г	23,5	3	Витамины			
Пребиотики (ГОС/ФОС) в т. ч.	г	1,8	0,25	Витамин А	мкг экв. ретинола	590	81,7
- галактоолигосахариды	г	1,62	0,224	Витамин Д	мкг	9	1,2
- фруктоолигосахариды	г	0,18	0,025	Витамин Е	мг экв. токоферола	8,6	1,19
				Витамин К	мкг	45	6,2
				Витамин С	мг	90	12,5
				Витамин В1	мг	0,92	0,13
				Витамин В2	мг	1,2	0,17
				Ниацин	мг	4,5	0,6
				Витамин В6	мг	0,5	0,07
				Фолиевая кислота	мкг	120	16,6
				Пантотеновая кислота	мг	5,5	0,76
				Витамин В12	мкг	1,5	0,21
				Биотин	мкг	18	2,5
				Холин	мг	80	11,1
				Инозит	мг	50	6,9
				L-Карнитин	мг	8,7	1,2
				Лютеин	мг	0,07	0,01
				Нуклеотиды	мг	14,5	2,0
Осмотическая				мОсм/кг	746		
Лактобактерии <i>L.Reuteri</i>				КОЕ/г	не менее 1,0x10 ⁶		