

Detalii

Momeala pentru combaterea rozatoarelor sub forma de pliculete, , pe baza de Brodifacum, care este unul dintre cele mai puternice rodenticide.

Substanta activa: Bromadiolon 0.0025% + Benzoate de denatoniu 0.001%

Daunatori: Sobolani si Soareci.

Aplicare: in interior si in exterior (in jurul cladirilor) si in reseaua de canalizare.

Este o momeala gata de utilizare, care foloseste un amestec de faina, grau de calitate superioara, cereale tocate, untura moale si aroma de arahide sintetice, oferind o masa completa rozatoarelor si poate fi folosita cu succes acolo unde rozatoarele au refuzat alte momeli. Utilizarea aromei de arahide sintetice permite produsului sa fie folosit in situatii sensibile, atunci cand produsele care contin nuci nu sunt autorizate.

Sturm brichete este un raticid eficient impotriva tuturor rozatoarelor, ce ofera cele mai bune rezultate, de fiecare data.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

Impotriva sobolanilor:

1. Securizati momeala in cantitati de **10-60 gr** in statii de intoxicare acoperite, protejate cu cheie, plasate la interval de 10 m (5 m in zonele cu infestare ridicata) in zonele in care sobolanii au fost semnalati.
2. Verificati la intervale regulate consumul momelilor si inlocuiti-le pe cele consumate, sau deteriorate, pana cand consumul inceteaza. Repetati tratamentul in cazul infestatiilor nou aparute (Ex: urme noi sau excremente).
3. Nu mutati si nu deranjati statiile de intoxicare timp de cateva zile dupa plasarea momelii. Daca in 7-10 zile nu se semnalizeaza consumul momelii din statiile de intoxicare, mutati-le in alta zona pe care o considerati infestata cu sobolani.
4. Daca toata momeala a fost consumata, reincarcati statiile de intoxicare cu cantitatea de momeala maxima admisa si plasati mai multe statii de intoxicare. Inlocuiti momelile consumate de rozatoare, sau cele care au fost afectate de apa sau contaminate de murdarie.
5. Nu mariti cantitatea de raticid in statia de intoxicare.

Impotriva soarecilor:

1. Securizati momeli de **10 gr** in statii de intoxicare acoperite, plasate la interval de 5 m (2 m in zonele cu infestare ridicata), in zonele in care au fost vazuti soareci.
2. Verificati la intervale regulate consumul momelilor si inlocuiti-le pe cele consumate sau deteriorate pana cand consumul inceteaza. Repetati tratamentul in cazul infestarilor nou aparute (Ex. urme noi sau excremente).
3. Soarecii sunt foarte curiosi si ar putea ajuta programul de combatere daca ati muta momelile la interval de 2-3 zile, atunci cand punctele de intoxicare sunt inspectate si reumplute.
4. Controlati frecvent punctele de intoxicare in primele 10-14 zile si inlocuiti momelile consumate de rozatoare, sau cele care au fost afectate de apa sau care au fost contaminate de murdarie.
5. Daca toata momeala a fost consumata, reincarcati statiile de intoxicare cu cantitatea de momeala maxima admisa si plasati mai multe statii de intoxicare.
6. Nu mariti cantitatea de raticid in statia de intoxicare.

Pentru utilizare in sistemele de canalizare, unde nu exista risc pentru copii, animale de companie si specii neavizate se vor securiza plicurile la structurile disponibile, cu sarma, astfel incat plicurile sa nu fie luate de apa.

- Securizati momeli de **10-60 gr** pe statie, la structurile disponibile, astfel încat momeala

sa nu fie luata de apa.
- Verificati la intervale regulate consumul momelilor si inlocuiti momelile consumate sau deteriorate pana cand consumul inceteaza.
- Repetati tratamentul in cazul infestatiilor nou aparute.

Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei