

Плановой вакцинации подлежат только клинически здоровые животные с нормальной температурой тела.

Не применять вакцину за 14 суток до забоя животных.

При вынужденном убое, туши привитых к этому сроку животных и боенские продукты направляют на техническую переработку, а при необходимости сжигают.

Молоко от животных с поствакцинальными осложнениями обезвреживают кипячением в течение 2-х часов.

Взаимодействие с другими средствами

За 10 дней до вакцинации и в течение 10 дней после применения вакцины не рекомендуется обрабатывать животных антибиотиками, а также против инфекционных, инвазионных заболеваний и кожных паразитов.

Особые указания (при беременности, лактации)

Молоко от привитых животных разрешается использовать без ограничения.

Способ применения и дозы

Вакцину вводят только подкожно.

Овцам и козам в области средней трети шеи или внутренней поверхности бедра в объеме 0,5 см³. Лошадям, крупному рогатому скоту и пушным зверям в области средней трети шеи в объеме 1 см³. Свиньям - в области внутренней поверхности бедра или за ухом в объеме 1 см³.

Молодняк крупного рогатого скота, пушных зверей и свиней первый раз прививают с 3-х месячного возраста в объеме 1 см³, молодняк мелкого рогатого скота - с 3-х месячного возраста в объеме 0,5 см³, жеребят - с 9 ти месячного возраста в объеме 1 см³.

Повторно молодняк ревакцинируют через 6 месяцев после первой вакцинации.

Взрослых животных иммунизируют 1 раз в год.

Побочные эффекты

Возможны поствакцинальные осложнения в виде повышения температуры тела животных, возникновение отеков, на месте введения вакцины. Таких животных выделяют из стада и лечат.

Период выведения

14 суток

Специальные предостережения для лиц и обслуживающего персонала, которые применяют ВИП

Соблюдать правила личной гигиены при введении вакцин. В случае случайной само инъекции необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, имея при себе открытку-вкладку или этикетку на данный препарат.



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ІНЖЕНЕР З ПН *[Signature]* КАПІТІЛОВА О.
30.04.20