

“Luxfarmol” S.R.L.	“FARMOL – CID”	p. 1 din 2
Data ultimei revizuirii: 05.03.2020	Dezinfectant pentru dezinfecția rapidă a mâinilor și suprafețelor	

1. Caracteristica generală

1.1 Dezinfectant prezintă o soluție gata pentru utilizare, sub formă de lichid de culoare albastru deschis, transparent cu miros specific de alcool sau parfumat.

1.2 În calitate de substanța activă conține: **etanol** – 70 - 75%, **benzalconium chloride** - 0,1 - 0,2%, **albastru de metilen**.

1.3 Farmol-Cid posedă activitate biocidă către bacteriile **Escherichia coli**, **Staphilococcus aureus**, **Pseudomonas aeruginosa**, fungii **Candida albicans** și virusi (**Adenovirus tip 5**).

1.4 Grupa principală produsului **1** - Dezinfectanți și produse biocide generale; tipul de produs **1, 2, 3, 4** – utilizate pentru igiena umană; de uz casnic, domeniul sănătății publice, industriei alimentare; pentru igiena veterinară, inclusiv produse folosite în zonele în care se cresc, se adăpostesc sau se transportă animale; dezinfectarea echipamentelor, containerelor, obiectelor de inventar, suprafețelor sau conductelor folosite pentru producerea, transportul, depozitarea ori consumul produselor alimentare, hranei pentru animale sau al băuturilor (inclusiv apa potabilă) de uz uman și animalier.

1.5 Certificat de Înregistrare de stat / Avizare Sanitară al produsului biocid **nr. 00268 din 02.12.2016** (rectificat la 05.03.2020).

2. Domeniu de utilizare

2.1 Destinat pentru dezinfecția igienică rapidă a mâinilor și suprafețelor în toate domeniile vieții; în condiții de igiena sporită, unde dezinfecția este măsură principală de profilaxie pentru evitarea focarelor de infecții:

- pentru igienă a mâinilor a personalului medical: în instituții de copii în domeniul sănătății, instituțiile preșcolare și școlare, instituțiilor de asigurări sociale (case de bătrâni, personae cu handicap, etc.); mâinile lucrătorilor de comerț, întreprinderi de alimentație publică, servicii comunale; de asemenea articolelor de îngrijire a bolnavilor.

- pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor în institutii medicale, industria alimentară, întreprinderi de alimentație publică: meselor de laborator, fotoliilor stomatologice, piese a utilajului medical, transport - vehicule medicale, frigidere și congelatoare în domeniul ocrotirii sănătății și în industria alimentară.

3. Prepararea soluțiilor de lucru

3.1 Dezinfectantul este gata pentru utilizare.

4. Utilizare dezinfectantului

4.1 Dezinfectia igienica a mâinilor: se aplică pe mâini nu mai puțin de 3 ml de produs și se fricționează până la uscare. Timpul de acțiune nu mai puțin de 30 de secunde, acordând o atenție deosebită la tratamentul de îngrijire a unghiilor și a spațiilor interdigitale.

4.2 Dezinfecția chirurgicală a mâinilor: se aplică pe mâini de 2 ori câte 3 – 6 ml, astfel ca toată suprafața de dezinfectare să fie acoperită cu soluție. Timpul de fricționare – 3 minute. Dezinfectării se supun atât palmele, cât și antebrațul.

4.3 Dezinfecția suprafețelor rezistente la alcool: se prelucrează prin pulverizare sau ștergere (15 – 20 gr/1m²), lăsând până la uscare completă. Timpul de acțiune – min. 30 secunde. Nu necesită clătire.

5. Măsuri de precauție

5.1 Citiți întotdeauna eticheta și informația despre produs înainte de utilizare.

“Luxfarmol” S.R.L.	“FARMOL – CID” Dezinfectant pentru dezinfecția rapidă a mâinilor și suprafețelor	p. 2 din 2
Data ultimei revizuirii: 05.03.2020		

5.2 Numai pentru uz extern!

5.3 Nu lăsați la îndemîna copiilor!

5.4 Inflamabil!!! Păstrați departe de surse inflamabile, inclusiv fumatul.

5.5 Evitați contactul cu ochii!

5.6 Nu ingera! Nu se aplică la rani sau mucoase.

6. Măsuri de prim - ajutor în caz de intoxicații accidentale

6.1 În cazul contactului cu ochi - de spălat bine cu multă apă curgătoare și de picurat soluție de 30% Sulfacil de sodiu.

6.2 În cazul contactului cu pielea - inofensiv.

6.3 În cazul înghițirii, este necesar de a clăti cavitatea bucală cu o cantitate mare de apă și de a consuma apă pentru diluarea dezinfectantului. Se recomandă provocarea vomitării. Consultați un medic.

6.4 În cazul de inhalare cu vaporii dezinfectantului, este necesar de a scoate persoana la aer curat. Dacă persoana nu respiră, este necesar de face respirație artificială. Dacă respirația este îngreunată, este necesar de a asigura alimentarea cu oxigen. Consultați un medic.

7. Termenii și condiții de păstrare

7.1 Termen de valabilitate a dezinfectantului - **5 ani**.

7.2 Păstrați în ambalaj original închis al producătorului, în încăperi uscate, departe de lumina directă, medicamente, alimente și substanțe ușor inflamabile, la temperatură de la - 5°C pînă la +30 °C.

7.3 A se evita formarea electricității statice în încăperile de păstrare a dezinfectantului.

7.4 După data de expirare - utilizarea este interzisă.

8. Metode fizico-chimice și analitice de control

Indicii	Norma
Aspectul exterior	lichid omogen transparent fără impurități straine
Culoare	incolor pînă la albastru deshis
Miros	specific de alcool sau parfumat
Densitatea, g/cm ³	0,877 - 0,894
Alcool etilic %, V/V	70 - 75
Conținutul în produs a sărurilor cuaternare de amoniu în recalcul la clorură de benzalconiu, %	0,1 – 0,2

8.1 Aspectul exterior, culoare, miros se determină vizual în conformitate cu GOST 14618.0, p.3.

8.2 Determinarea densității se efectuează prin metoda gravimetrică în conformitate cu GOST 18995.1-73.

8.3 Frația volumului de alcool etilic determină în conformitate cu GOST 29188.6.

8.4 Determinarea sărurilor de amoniu în dezinfectant se efectuează în conformitate cu SF 1008611001268-002-2016 (p. 5.5).

Ambalaj: 50ml cu spray, 1L, 5L, 10L, 1T