

Aviz sanitar nr. 1060 din 02.05.2015
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PEROXID DE HIDROGEN

soluție cutanată 6 %

Hydrogenii peroxidum

100 ml conține: peroxid de hidrogen soluție 30% – 10,0g; benzoat de sodiu, apă purificată – până la 100 ml.

Antiseptic din grupul oxidanților. Sub influența catalazei și peroxidazei se descompune în apă și oxigen atomic cu putere oxidativă mare. La nimerirea soluției în rană are loc oxidarea substanțelor organice – proteinelor, sângelui, puroiului, bacteriilor. Oxigenul degajat are și efect mecanic, înlăturând puroiul și corpii străini din rană în urma formării unei spume abundente. Această spumă contribuie la formarea trombilor și oprirea sângerărilor mici. Acțiunea antiseptică este slabă și de scurtă durată.

Domeniu de utilizare

Prelucrarea primară a rănilor superficiale; oprirea sângerărilor capilare din rănilor superficiale, sângerări din nas. Gargarisme în caz de inflamații ale mucoasei cavității bucale, amigdalelor; spălături în bolile ginecologice.

Mod de utilizare

Extern. Porțiunile afectate ale pielii sau mucoaselor se prelucrează cu un tampon de vată sau tifon îmbibat în soluție de 1-3%. Gargarismele se efectuează cu soluție 0,25%.

Efecte nedorite

Senzație de usturime în timpul prelucrării răni. În unele cazuri sunt posibile reacții alergice.

Restricții în utilizare:

Alergie la componentele produsului.

Atenționări:

A se evita nimerirea produsului în ochi. Nu se utilizează pentru spălarea cavităților. Expunerea la lumină și căldura reduc activitatea produsului.

Condiții de păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25 °C.
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Fabricat:

SRL Farmacia Cojușna
Republica Moldova, r-nul Strășeni,
s. Cojușna, str. Podgorenilor, 1
tel./fax: 0 237 42 927, 0 237 42 408

Câte 40 ml, 100 ml sau 1000 ml în flacon.

Seria: a se vedea pe ambalaj.

Data de expirare: a se vedea pe ambalaj.