

## **RO** Effect Microtech CS PRO

împotriva insectelor târâtoare

insecticid microîncapsulat specializat – concentrat

puterea a trei substanțe active  
eficacitate pe termen lung

**Instrucțiuni de folosire:** Microtech CS PRO se folosește pentru controlul (dezinsecția) dăunătoarelor târâtoare, cum ar fi gândacii (*Blatella germanica*, *Blatta orientalis*), furnicile negre (*Monomorium pharaonis*) și ploșnițe de pat (*Cimex lectularius*) și anume în zonele în care sunt repelate dăunătoarele târâtoare – în fisurile din perete și marginile inferioare ale pereților și mobilierului din interiorul clădirilor. În plus, produsul poate fi aplicat și pe pereții exteriori ai clădirilor.

Eficacitatea produsului Microtech CS PRO este vizibilă deja în primele 24 de ore. Microtech CS PRO este destinat pulverizării imediat după preparare. Produsul trebuie agitat înainte de utilizare.

După aplicarea produsului, trebuie evitat contactul cu suprafețele tratate.

### **Pentru a combate o infestare masivă pe:**

- suprafețe netede, cum ar fi: lemn, sticlă, ceramică

se diluează 100 ml de Microtech CS PRO în 5 l de apă. Soluția pregătită este suficientă pentru utilizarea pe 100 m<sup>2</sup> de suprafață.

- suprafețe poroase cum ar fi: suprafețe de beton

se diluează 125 ml de Microtech CS PRO în 5 l de apă. Soluția pregătită este suficientă pentru utilizarea pe 100 m<sup>2</sup> de suprafață.

**Pentru a combate o infestare redusă** pe o suprafață netedă, cum ar fi: lemn, sticlă, ceramică, se diluează 25 ml de Microtech CS PRO în 5 l de apă. Soluția pregătită este suficientă pentru utilizarea pe 100 m<sup>2</sup> de suprafață.

**Eficacitatea produsului:** Microtech CS PRO atinge o eficacitate extrem de îndelungată de până la 6 luni, ca urmare a formulării cu microcapsule membranare specifice, ce permite o eliberare mai lentă a substanței active, îmbunătățită prin aderarea directă a capsulelor de corpul insectelor, ceea ce duce la creșterea eficienței insecticidului. Microtech CS PRO conține pralletrin, permetrin și PBO (Piperonil butoxid); pralletrin asigură o acțiune rapidă (knock down), permetrin permite o acțiune reziduală suplimentară a agentului, iar Piperonil butoxid crește în continuare eficacitatea preparatului. Microtech CS PRO acționează atunci când este ingerat și/ sau în contact cu sistemul nervos al insectei.

### **Substanțe active:**

permetrin (ISO) ..... 8% (8 g/ 100 g) nr. CAS: 52645-53-1;

pralletrin (ISO) ..... 1% (1 g/ 100 g) nr. CAS: 23031-36-9;

PBO – Piperonil butoxid ..... 8% (8 g/ 100 g) nr. CAS: 51-03-6



## Atenție

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P501 Aruncați conținutul/recipientul în acord cu regulamentele naționale.

**Formulare:** suspensie încapsulată (CS)

**Tip de utilizatori:** Produsul este destinat utilizării profesionale și industriale.

**Autorizația nr.:** Nr. 00130

**Instrucțiuni de prim ajutor:** Instrucțiuni/ măsuri generale: Nu dați nimic de mâncat sau de băut victimei inconștiente. Așezați victima în poziție culcată laterală și asigurați permeabilitatea căilor respiratorii. În caz de contact cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată. Clătiți imediat cu multă apă și săpun părțile corpului care au intrat în contact cu preparatul. Consultați medicul dacă apar simptome. În caz de contact cu ochii: Clătiți imediat ochii deschiși, și sub pleoape, cu multă apă curentă. Consultați medicul. În caz de inhalare (excesivă): Transferați victima la aer curat – părăsiți zona contaminată. Dacă apar simptome, consultați medicul. În caz de ingestie: Nu induceți voma! Clătiți bine cu apă cavitatea bucală. În caz de îndoială sau în caz de simptome, consultați medicul. Arătați medicului fișa tehnică de securitate sau eticheta.

**Depozitare:** A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat. A se depozita separat de alimente, băuturi și furaje. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului biocid și a ambalajului său:** Eliminarea reziduurilor de produs: A se lăsa la un colector/ eliminator/ valorificator autorizat. Ambalaj: A se lăsa ambalajul golit complet la un colector de deșeuri autorizat.

**Producător și titular de licență:** Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija, Tel.: +386 1 75 58 152, unichem@unichem.si, www.unichem.si

**Distribuitor:**

**Data fabricației, data expirării și nr. lot:** pe ambalaj.

**Conținut:**... ml