

**preNAN® (pentru sugarii > 1800 g), formulă de lapte praf instant de început pentru alimentația sugarilor de la naștere. este un aliment destinat unor scopuri medicale speciale, pentru regimul dietetic al sugarilor cu greutate mică la naștere și prematuritate**

PreNAN® este un aliment destinat unor scopuri medicale speciale, care furnizează cantitățile adecvate de nutrienți pentru a acoperi nevoile de dezvoltare rapidă a sugarilor cu greutate mică la naștere, peste 1,8 kg (prematuri și dismaturi).

**Ingrediente:** lactoză, uleiuri vegetale (floarea soarelui, palmier bogat în  $\beta$ -palmitat, cocos, rapiță cu conținut scăzut de acid erucic, floarea soarelui cu conținut ridicat de acid oleic și de Mortierella alpina bogat în ARA), maltodextrină, izolat de proteine hidrolizate din **zer**, concentrat de proteine hidrolizate din **zer**, trigliceride cu lant mediu (MCT), minerale (glicerofosfat de calciu, citrat de potasiu, citrat de sodiu, clorură de magneziu, clorură de potasiu, clorură de calciu, sulfat feros, sulfat de zinc, sulfat cupric, iodură de potasiu, sulfat de mangan, selenat de sodiu), ulei de **pește**, , vitamine (C, E, A, B5, B3, D, K, B1, B2, B6, acid folic, B12 și biotina), colină, inozitol, L-arginina, taurina, L-carnitina.

**Valoarea nutritivă per 100 ml amestec preparat :** Valoarea energetică 73/306 kcal/kJ, Grăsimi: 3,8 g, dintre care acizi grași saturați: 1,6g; Acid linoleic: 691mg; Acid alfa-linolenic: 60mg, Acid arahidonic (ARA): 18mg, Acid docosahexaenoic (DHA): 18mg, Proteine: 2,0g, Carbohidrați: 7,7g, dintre care zaharuri 5,5g, Vitamina A: 68 $\mu$ g echiv. retinolului, Vitamina D: 1,8 $\mu$ g, Vitamina E: 0,9mg, Vitamina K: 4,3 $\mu$ g, Vitamina C: 17mg, Vitamina B1: 0,06mg, Vitamina B2: 0,16mg, Niacină PP: 0,5 mg, Vitamina B6: 0,04mg, Acid folic: 16 $\mu$ g, Vitamina B12: 0,2 $\mu$ g, Biotină: 1,3 $\mu$ g, Acid pantotenic: 0,5mg, Sodiu: 36mg, Potasiu: 84mg, Cloruri: 55mg, Calciu: 82mg, Fosfor: 50mg, Magneziu: 6,8mg, Fier: 0,8mg, Zinc: 0,9mg, Cupru: 0,06mg, Mangan: 0,02mg, Flor: 0,009mg, Seleniu: 4,5 $\mu$ g, Crom: 4,3 $\mu$ g, Molibden: 4,3 $\mu$ g, Iod: 17 $\mu$ g, Colină: 24mg, Izonitol: 19mg, Carnitină: 2,9mg, Taurină: 4,3mg. Lingurița de măsură 4,8 g, 100 ml = 14,4 g de lapte praf (3 lingurițe de măsură) + 90 ml de apă.

**Notă importantă:** Alimentația ideală pentru sugari este laptele de mamă. OMS recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni. Nestle susține această recomandare. Înainte de a lua decizia de a alege o formulă de lapte pentru sugari, consultați medicul.

**Prepararea:** 1. Spălați-vă bine mâinile înainte de a pregăti amestecul. 2. Spălați bine sticluța, tetina și capacul ca să nu rămână urme de lapte. 3. Fierbeți-le 5 minute și lăsați-le acoperite până la folosire. 4. Fierbeți apa potabilă timp de 5 min, lăsați-o să se răcească până la 37°C. 5. Conform "Tabelului de alimentație a copilului", adăugați în sticla fiartă cantitatea strict măsurată de apă caldă. 6. Conform "Tabelului de alimentație a copilului", adăugați cantitatea exactă a lingurițelor de măsură de lapte praf, în conformitate cu vârsta copilului dvs. Folosiți numai lingurița de măsură aflată în această cutie, umplută fără vârf. 7. Agitați sticluța până la dizolvarea completă a prafului. 8. După utilizare, puneți lingurița în marginea cutiei, după cum este desenat. 9. Agitați bine sticluța până la dizolvarea laptelui praf. 10. După pregătirea amestecului, închideți ermetic cutia cu praf și păstrați în loc uscat și răcoros. **Avertizare:** Apa nefiartă, biberoanele nesterilizate, păstrarea, transportarea și prepararea incorectă a formulei de lapte pentru sugari poate duce la îmbolnăvirea nou născutului. **Atenție!** Amestecul trebuie preparat nemijlocit înainte de fiecare alimentare. Urmați instrucțiunea cu exactitate. Amestecul dizolvat rămas nu se păstrează sau utilizează ulterior. În timpul alimentării este necesar să sprijiniți copilul, ca să nu se înece. Când copilul va mai crește, treceți la alimentarea cu ceașcă.

**Tabelul de alimentare:**

Greutatea bebelușului în grame	Cantitatea pentru o alimentare		Numărul de alimentări pe zi cu amestec
	Apă fiartă, ml*	Cantitatea ling.de măsură**	
1800 - 3000	la recomandarea medicului		
3000 - 4000	90	3	6
4000 - 5000	120	4	6
5000 - 6000	150	5	5
6000 - 7000	150	5	5
7000 - 8000	180	6	4

\*Pentru a păstra cantitatea bacterilor vii, lăsați apa fiartă să se răcească aproximativ până la temperatura corpului, apoi adăugați amestecul uscat. \*\*Notă: Pentru pregătirea amestecului, este necesar să folosiți lingurița de măsură, umplută fără vârf. Dizolvarea cantității incorecte de praf - mai multă sau mai puțină, comparativ cu cantitatea specificată în tabel - poate duce la deshidratarea organismului copilului, sau la tulburări de alimentație. Cantitatea specificată în tabel nu poate fi schimbată fără recomandarea lucrătorului medical. \*\*\*La această vârstă, este des recomandat să introduceți treptat în regimul alimentar al copilului alimente complementare: terciuri, legume, fructe, carne și pește. Ținând cont de diferențele individuale de necesități ale copiilor, adresați-vă pentru consultație lucrătorului medical.

**Data producerii și expirării sunt indicate pe partea de jos a ambalajului.**

Până și după deschiderea ambalajului, produsul se păstrează la temperatura de nu mai mult de 25°C și umiditatea relativă a aerului de 75%. După deschiderea ambalajului, produsul se păstrează timp de 3 săptămâni. Nu se recomandă păstrarea în frigider. **Masa netă: vezi pe ambalaj.**

**Producător:** Nestlé Deutschland AG, DE-60528, Lyoner Str. 23, Frankfurt am Main, Germania. Fabrica din Biessenhofen DE – 87640, Fussener Str. 1, Germania.

**Distribuitor:** “Hendrix-Bail” SRL Republica Moldova, MD-2004, or.Chișinău, Bucuria ½, Depozit Republica Moldova, MD-2001, or.Chișinău, str.Bucuria 1 tel.+373 22 292825

**Importator:** “Nestle” SRL Republica Moldova, MD-2001, or.Chișinău, str.Tighina 49/4, et.3.Tel.: (022) 211-175.

**Adresați sugestiile și reclamațiile dumneavoastră importatorului.**