

BIOVETA, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Haně, Republika Cechá,
e-mail: comm@bioveta.cz

PROSPECT

Biocan R

Vaccin inactivat împotriva rabiei
Virus rabiei inactivatum (min. 2 IU)

1. DENUMIREA ȘI ADRESA TITULARULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Haně, Republika Cechá.

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Biocan R - Suspensie pentru injecție

Vaccin inactivat împotriva rabiei

3. LISTA INGREDIENTELOR ACTIVI ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Compoziție -1 ml:

Ingredient activ - *Virus rabiei* inactivatum, tulpina SAD Vnucovo-32 min.2 IU

Excipienți - Nutrimentum MEM, Algedratum, Thiomersalum

Adjuvant – hidroxid de aluminiu

4. INDICAȚII

Pentru imunizare activă a speciilor de animale-țintă împotriva rabiei.

5. CONTRAINDICAȚII

Boală febrilă sistemică. Animale nevaccinate, rănite sau în contact cu animalele infectate de rabie. Animalele, care afectează sau rănesc un om, pot fi vaccinate numai după încheierea unei perioade de observare.

6. EFECTE ADVERSE

Reacție locală adecvată (de obicei de mărimea unui bob) poate fi descoperită la locul de administrare a preparatului și dispare în decurs de 3 săptămâni. Hipersensibilitatea are loc rar.

7. SPECIILE DE ANIMALE-ȚINTĂ

Câini, pisici, dihori, bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine.

8. DOZAJ PENTRU FIECARE SPECIE, MOD DE UTILIZARE ȘI METODĂ DE ADMINISTRARE

Dozaj – 1 ml indiferent de vârstă, greutate și specia individualului, însă cel devreme la vârstă de 12 săptămâni.

Metodă de administrare:

- Subcutaneu, cel mai bine în regiunea posterioară a scalpului.
- Intramuscular, cel mai bine în mușchiul părții de jos a fesei.

Animalele se vaccinează de la vârsta de 3 luni. Imunitatea de protecție se formează după 14 zile de la imunizare. Animalele vaccinate mai devreme decât la vârsta de 3 luni trebuie să fie revaccinate după ce au atins această vârstă (trebuie să fie respectat intervalul de minim 14 zile dintre vaccinări). Animalele vaccinate pentru prima dată, la vârsta de 3-12 luni, trebuie să fie revaccinate la 1 an după prima aplicare a vaccinului. Revaccinarea efectuată la un an după primul vaccin protejează animalele împotriva rabiei, timp de cel puțin 2 ani. Pentru a menține imunitatea, este recomandat de a revaccina în conformitate cu reglementările veterinare din fiecare țară.

Interacțiunea cu alte produse medicale și alte forme de interacțiune

Vaccinul Biocan R poate fi utilizat separat, simultan sau în combinație cu alte vaccinuri Biocan:

- A) Vaccinul Biocan R poate fi utilizat ca un diluant pentru alte vaccinuri liofilizate Biocan (de exemplu DHPPi, DP, P).
- B) Vaccinul Biocan R poate fi administrat simultan sau cu vaccinurile lichide Biocan C, Biocan B, Biocan M și Biocan L.

Nu este disponibilă nici o informație cu privire la siguranța și eficacitatea acestui vaccin atunci când acesta se utilizează cu un alt produs medicinal veterinar, cu excepția produselor menționate mai sus. Prin urmare, decizia de a folosi acest vaccin înainte sau după orice alt produs medicinal veterinar, trebuie să se luată în dependență de fiecare caz concret.

Schema de vaccinare recomandată pentru Biocan

Vârsta cățelului	Stare infecțioasă		
	Favorabil	Nefavorabil Parvoviroză	Nefavorabil Boală severă
5-6 săptămâni		Cățel (P) +C	Cățel (DP) +C
7-8 săptămâni		Cățel (P) +C	Cățel (DP) +C
8-10 săptămâni	DHPPi+L	DHPPi+L	DHPPi+L
12-16 săptămâni	DHPPi+LR	DHPPi+LR	DHPPi+LR
Revaccinare timpurie	DHPPi+LR	DHPPi+LR	DHPPi+LR

Notă:

Vaccinurile din paranteze indică posibilitatea unei vaccinări alternative în locul vaccinului Biocan Puppy.

Vaccinurile marcate +C, +L, +LR indică posibilitatea de uz simultan sau combinat cu alte vaccinuri Biocan (ex. DHPPi, DHP, DP, DH, P, Puppy).

Vaccinări posibile adiționale: Biocan M – vaccin împotriva *Microsporium canis* a câinilor și pisicilor pentru utilizare de la vârsta de 12 săptămâni.

9. INSTRUCȚIUNI PENTRU ADMINISTRARE

Conținutul flaconului trebuie să fie agitat înainte de utilizare.

Vaccinarea indivizilor numai clinic sănătoși într-o stare bună nutrițională. Tratament anti-parazitare posibil trebuie să preceadă vaccinarea cu cel puțin zece zile. Timp de o săptămână după vaccinare, nu este recomandat de a efectua orice instruire cu animalele vaccinate sau orice alte acțiuni.

10. PERIODA DE AȘTEPTARE

0 zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în loc uscat și întunecos la o temperatură de 2 – 8⁰ C.

Nu congelați!

Termen de valabilitate – 24 luni.

A se utiliza în decurs de 10 ore după prima deschidere.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

12. AVERTIZĂRI SPECIALE

Nu se aplică

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DACĂ ESTE

Toate produsele medicinale veterinare sau deșeurile de la acest produs trebuie să fie eliminate conform reglementărilor locale.

14. Precauții speciale pentru persoane și personalul tehnic care administrează vaccinul

Personalul tehnic înainte de vaccinare trebuie să îmbrace haine speciale (halat, mănuși de cauciuc de o singură folosință, încălțăminte specială). La nimerirea vaccinului pe piele de spălat cu apă cu săpun.

15. DATA ULTIMII APROBĂRI A INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Noiembrie, 2011

16. ALTĂ INFORMAȚIE

Doar pentru tratamentul animalelor.

Acest produs medicinal veterinar este disponibil doar cu prescripție.

În caz de apariție a oricăror reacții adverse, contactați deținătorul certificatului de înregistrare și/sau Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.