



Внимание!

Вреден при поглъщане. Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Може да причини увреждане на белите дробове при продължителна или повтаряща се експозиция. Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Може да усилва пожара; окислител.
ПРИ ПОЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.
При неразположение се обадете в **ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ** или лекар.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Избягвайте вдъшване на прах.
Да се съхранява на проветриво място в плътна затворена опаковка при температура < 40 °C.
Да се съхранява извън обсега на деца. Използвайте предпазни очила!

SANIFORT

САНИФОРТ – препарат за дезинфекция на повърхности и дезинфекция на вода
ЕФЕРВЕСЦЕНТНИ ТАБЛЕТИ 3,3 g

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Натриев дихлоризоцианурат дихидрат (CAS No 51580-86-0) (81.8g/100g, активен хлор > 1.3г)

Препарат с бактерицидно, фунгицидно, микобактерицидно (*Mycobacterium tuberculosis* avium), пълно вирусцидно, алтицидно и спороцидно (*B. subtilis*, *B. cereus*) действие

ГЛАВНА ГРУПА 1: Дезинфектанти

Продуктов тип 2: Дезинфектанти и алтициди, които не са предназначени за пряка употреба върху храна или животни.

Продуктов тип 3: Ветеринарна хигиена

Продуктов тип 4: Обект на употреба, свързана с храна и фуражи

Обект на дезинфекция	Концентрация на разт. р-р	Спектър на действие	Експозиция
Повърхности в зони с по-нисък риск	1 табл./10L вода	бактерицидно, фунгицидно и вирусцидно	15 мин.
Повърхности в рискови зони			
Бели текстилни тъкани, работно облекло, обувки	2-3 табл./10L вода	бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно, вирусцидно и спороцидно.	15-30 мин.
Лабораторна състелария			
Санитарни възли			
Съдове, прибори в кухненски боксове	2 табл./10L вода	бактерицидно, фунгицидно и вирусцидно	15 мин.
Дезинфекционни барieri	2 табл./10L вода	бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно и вирусцидно.	15 мин.
Плувни басейни (сладка вода)	4-8 табл./1000L вода	Хиперхлорирание при първоначално пълнене	12 часа (в отсъствие на климатизация)
	1/4 - 1/2 табл./1000L вода	Поддържаща доза	1 - 2 пъти дневно *

* на 12 часа при концентрация на свободен хлор 0.2 - 0.5 mg/L вода

За прецизна дозировка на препарат следва да се отчита хлор-потливаемостта на водата.

ЖИВАС ООД

София 1592, Бул. Асен Йорданов 14
тел.: 02 9817823, www.zhivas.com



БУЛЕКОТАК



BG040/0102



e 1 kg

ZHIVAS

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И МАСОВА УПОТРЕБА Разр. на МЗ-2130-1/2017