F-SOP-02-013-01

ФМБА РОССИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России)

198320 Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, 52, тел.(812) 741-10-58, факс: (812)741-28-95

ПАСПОРТ № 628 от 11.12.2020

ФЕМИДАСЕРА®

Сыворотка преципитирующая белки сыворотки крови крупного рогатого скота адсорбированная диагностическая для судебно-медицинских целей (Сыворотка преципитирующая белки сыворотки крови крупного рогатого скота), раствор для диагностических целей

ФСР 2007/00346
ТУ 9389-017-01895016-07, изм.№1
84-1220
138 упаковки
01.12.2020
До 1221

Результаты испытаний

Контролируемые показатели	Требования спецификации	Методы контроля	Результаты испытаний
Внешний вид	Прозрачная жидкость от светло-желтого до красновато-бурого цвета. Допускается мутность	Визуальный	Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета
Герметизация	Ампулы должны быть герметично запаяны	Физический	Ампулы герметично запаяны
Подлинность	Сыворотка должна вызывать реакцию кольцепреципитации с гомологичным антигеном и не должна вызывать реакцию кольцепреципитации с гетерологичными антигенами	Серологический	Сыворотка вызывает реакцию кольцепреципитации с гомологичным антигеном (быка) и не вызывает реакцию кольцепреципитации с гетерологичными антигенами (человек, лошадь, свинья, собака, кошка)

F-SOP-02-013-01

Специфическая	Сыворотки,	Серологический	Сыворотка образует
активность	преципитирующие	o sponorm rockim	кольца преципитации
1222 pr 10-200 (100 to 10) 120 (100 to 10)	белки сыворотки		при разведении
	крови человека,		гомологичного
	лошади, свиньи,		антигена:
	собаки, кошки,		1:1000 в течение
	кролика, курицы,		1 минуты
	рогатого скота		1:5000 в течение
	должны образовывать		1,5 минут
	кольца преципитации		1:10000 в течение
	при разведении		3,5 минут
	гомологичного		5,5 WHIIY I
	антигена 1:1000 в		Титр: 1:10 000
	течение 1-5 мин,		TATE: 1:10 000
	1:5000 и 1:10000 не		
	позднее, чем через 10		
	мин.		Сыворотка,
	Сыворотки,		преципитирующая
	преципитирующие		белки сыворотки
	белки сыворотки		крови крупного
	крови лося, крупного		рогатого скота в
	или мелкого рогатого		разведении 1:1000 не
	скота должны		образует колец
	образовывать кольца		преципитации с
	преципитации при		антителами
	разведении		родственных видов
	гомологичного		животных в течение
	антигена 1:1000 в		20 мин.
	течение 1,5 - 7		
	мин, 1:5000 и 1:10000		Сыворотка не дает
	– не позднее, чем		реакцию
	через 30 мин.		кольцепреципитации
	Сыворотки,		ни с одним из
	преципитирующие		гетерологичных
	белки сыворотки		антигенов,
	крови крупного,		разведенных 1:1000 в
	мелкого рогатого		течение 1 часа
	скота, лося в		
1	разведении 1:1000 не		
	должны образовывать		
	колец преципитации с		
	антителами		100
	родственных видов		
	животных в течение		
	20 мин. Для		
	сыворотки,		
	преципитирующей		
	белки сыворотки		
	крови крупного		
	рогатого скота – это		
	баран, коза, лось. Для		
	сыворотки,		

F-SOP-02-013-01

	T	Para de la companya della companya della companya della companya de la companya della companya d	2004	
	преципитирующей	2110		
	белки сыворотки			
	крови мелкого			
	рогатого скота – это			
	лось, бык. Для			
	сыворотки,			
	преципитирующей			
	белки сыворотки			
	крови лося – это бык,			
	баран, коза.			
	Сыворотка считается			
	специфичной, если			
	она ни с одним из			
	гетерологичных			
	антигенов,			
	разведенных 1:1000		1	
	не дает колец			
	преципитации в		N=0	
	течение 1 ч.		1	
Маркировка	В соответствии с	Визуальный	Coomerca	
	ТУ 9389-017-	Disjuiding	Соответствует	
	01895016-07, изм.№1			
Упаковка	В соответствии с	Визуальный	По 1,0 мл в ампуле с	
	ТУ 9389-017-		точкой излома	
	01895016-07, изм.№1		номинальной	
			Вместимостью	
			1 мл из стекла. По 1	
			ампуле в контурной	
			ячейковой упаковке из	
			картона вместе с	
			инструкцией по	
			применению в пачке	
			из картона.	
			В ящик картонный	
			помещены пачки и	
			Makaparre	
Условия хранения	В соответствии с СГ	I 3.3.2.1248-03 при темп	enativne of 2 to 9 °C	
	В соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8 °C в защищенном от света месте			
Условия	В соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8 °C			
транспортирования				
			MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	

Заключение: серия 84-1220 соответствует/не соответствует требованиям нормативной (нужное подчеркнуть)

документации по всем показателям качества.

Начальник ОКК

Дубровская О.А. *ФИО*