Дополнение к регистрационному удостоверению
№ ВВ-00068-06-09
от 10.07.2019

Туберкулин перед введеним предварительно разводят растворителем для микобактериальных алергенов:
для птицы, овец и коз 1:1, для крупного рогатого скота -1:4.
Препарат вводят внутрикожно:
–курам - в бородку;
- индюкам - в подчелюстную сережку;
-гусям и уткам - в подчелюстную складку;
-фазанам, павлинам, попугаям, цаплям, аистам, журавлям, фламинго- в области внешней поверхности голени на 1-2см выше голеностопного сустава, а фазанам (самцам)- в кавернозное тело головы;
-свиньям –в области внешней поверхности уха на расстоянии 2см от его основания, а поросятам возрастом 2-3месяца в области крестца ;
крупному рогатому скоту в делянку средней трети шеи, бугаям-производителям- в подхвостовую складку, овцам и козам- внутрипальпебрально в нижнюю веку на (1,0-1,5) см ниже его края или во внутреннюю поверхность бедра.
Для введения туберкулина птице, овцам и козам используют только шприц и иглы для внутрикожных инъекций, для крупного рогатого скота и свиней безигольный инъектор.
Перед введением туберкулина в месте введения туберкулина перья и волосяной покров удаляют, а кожу протирают 70 % - ным раствором этилового спирта.

Учет и интерпретация результатов

- у птицы – через 30-36 часов после введения препарата;
- у свиней, овец и коз – через 48 часов;
- у крупного рогатого скота – через 72 часа.

Реакцию считают положительной: у птицы и свиней при условии образования на месте введения туберкулина отека или покраснения кожи; у крупного рогатого скота- образование разлитого отека (опухоли) с утолщением кожной складки более 4,0мм; у овец и коз- наличие на месте введения четко выраженного отека.

Неспецифические реакции

Могут возникнуть парааллергические реакции или псевдоаллергические реакции.

Передозировка

Не отмечалась

Специальные предупреждения для лиц и обслуживающего персонала

Не допускаются к работе с препаратом лица, которые имеют аллергическую чувствительность.

Мероприятия безопасности при поведении с неиспользованным ВИП, способы его уничтожения и утилизации

Обеззараживают кипячением на протяжении 30 минут.

Срок годности

2 года с даты изготовления. Препарат используют в день открытия флакона.

Digitally signed by Cucu Vasile
Date: 2020.07.31 12:30:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ІНЖЕНЕР З ПК КАПТІЛОВА О
30.07.20