

# INSTRUCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA PRODUSELOR DE DERATIZARE ȘI DEZINSECȚIE

**Către:** [Autoritatea Publică Receptoră]

**De la:** [Numele Companiei / Persoana Responsabilă]

**Data:** [Data Curentă]

---

**1. Introducere** Prezentele instrucțiuni au scopul de a reglementa utilizarea produselor de deratizare și dezinfecție în conformitate cu normele de siguranță și reglementările în vigoare. Se descriu caracteristicile produselor utilizate, metodele de aplicare și măsurile de precauție necesare.

---

## 2. Produse utilizate

### 2.1 Ratimor Brodifacoum Soft Bait

**Producător:** Unichem, Slovacia

**Descriere:** Rodenticid formulat pentru combaterea eficientă a șoarecilor și șobolanilor. Conține substanța activă brodifacoum și este îmbogățit cu uleiuri și grăsimi pentru a menține atractivitatea pe termen lung. Include agenți de stabilizare și un agent amar pentru reducerea riscului de ingerare accidentală.

#### Avantaje:

- Eficacitate ridicată chiar și în doze mici;
- Formulă stabilă, cu efect de lungă durată;
- Potrivit pentru medii cu surse naturale de hrană pentru rozătoare;
- Acțiune întârziată pentru o eliminare eficientă;
- Siguranță sporită prin conținutul de agent amar.

#### Mod de utilizare:

- **Pentru șoareci (*Mus musculus*):**
    - Dozaj: 10-20 g de momeală la intervale de 2-5 metri;
    - Monitorizare periodică și realimentare în funcție de consum.
  - **Pentru șobolani (*Rattus norvegicus* și *Rattus rattus*):**
    - Dozaj: 10-60 g de momeală la intervale de 5-10 metri;
    - Verificare regulată și înlocuire a momelii consumate.
-

## 2.2 Fendona® 6 SC

**Producător:** BASF, Germania

**Descriere:** Insecticid cu spectru larg destinat tratamentelor de dezinfecție în spații interioare și exterioare. Asigură un efect rapid și persistent împotriva insectelor sinantropice.

### Beneficii:

- Acțiune rapidă și eficiență ridicată;
- Persistență îndelungată pe suprafețele tratate.

### Mod de utilizare:

- **Pregătirea soluției de lucru:**
  - Se utilizează conform dozajului recomandat;
  - Se diluează în apă curată, la temperatura camerei.
- **Aplicare:**
  - Se utilizează pulverizatoare profesionale de înaltă presiune;
  - Suprafața tratată se monitorizează și se reîmprospătează tratamentul la nevoie.

### Doze recomandate:

- **Pentru gândaci de bucătărie:**
  - 40 ml preparat la 1 litru de apă;
  - Consumul soluției: 50 ml/m<sup>2</sup> pentru suprafețe netede, 100 ml/m<sup>2</sup> pentru suprafețe poroase.
- **Pentru purici, muște, furnici:**
  - 20-40 ml preparat la 1 litru de apă;
  - Consumul soluției: 50-100 ml/m<sup>2</sup>, în funcție de tipul suprafeței tratate.

---

## 3. Precauții și măsuri de siguranță aplicate

- Produsele trebuie utilizate doar de către personal instruit;
- Se respectă normele de protecție a muncii și instrucțiunile de siguranță specifice fiecărui produs;
- Produsele se depozitează în locuri sigure, ferite de umiditate și lumină directă;
- Se evită contactul cu pielea, ochii și ingerarea accidentală;
- Se respectă regulile de eliminare a deșeurilor rezultate în urma utilizării produselor.

---

**4. Concluzie** Prezentele instrucțiuni sunt elaborate pentru descrierea procedurii și a asigura utilizarea corectă și în siguranță a produselor de deratizare și dezinfecție.

**[Numele și Funcția Responsabilului]**

**[Date de Contact]**

