

**PROSPECT PENTRU UTILIZATOR**  
**Peroxid de hidrogen-MC**  
**soluție dezinfectantă 6%**

**DENUMIREA PRODUSULUI**  
**Peroxid de hidrogen-MC, soluție dezinfectantă 6%**

**COMPOZIȚIA**

100 ml conține:

Substanță activă: peroxid de hidrogen 30% - 20,0 g

Excipienți: benzoat de sodiu, apă purificată.

**PREZENTARE**

Lichid transparent, incolor, fără miros.

Peroxid de hidrogen-MC 6% soluție dezinfecțiantă, intră în categoria biocide.

Peroxid de hidrogen-MC 6% posedă o reducere a microorganismelor de referință *S. aureus* și *E. hirae* și a microorganismului de referință *C. albicans*.

**RECOMANDĂRI**

Peroxid de hidrogen-MC 6% – pentrudezinfecțarea suprafetelor din încăperi (podea, perete, uși etc.), transportului (ambulanță, transport public, ect); pentru dezinfecțarea obiectelor; pentru dezinfecția materialului de curățare; pentru dezinfecțarea și sterilizarea dispozitivelor medicale în unitatea sanitată rezistente la coroziune;

**ADMINISTRARE**

Timpul de contact necesar al Peroxid de hidrogen-MC 6% cu substratul tratat trebuie să fie 60 minute. Substanță chimică prin care se poate realiza dezinfecția de nivel înalt este: - Peroxidul de hydrogen-MC 6%.

**Avertizări de pericol (fraze H):** H225 Lichid și vapozi foarte inflamabili.; H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.; H318 Provoacă leziuni oculare grave.

**Recomandări de siguranță (fraze P):** P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la indemâna recipientul sau eticheta produsului.; P102 A nu se lăsa la indemâna copiilor; P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafete fierbinți, scânteie, flăcări și alte surse de aprindere. P305 + P351 + P338 În caz de contact cu ochii: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul

**EFFECTE NEDORITE**

Evitați pătrunderea soluției în ochi și pe mucoase.

Lumina și căldura reduc activitatea preparatului.

**CONTRAINdicări**

Hipersensibilitate la componente produsului.



## **ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE**

- 1.Se interzice de a scoate dopul flaconului cu dinți.
2. Este necesar de respectat procentajul solutiei pentru fiecare lavaj în parte.
3. După prelucrarea suprafetelor cu Peroxid de hidrogen-MC 6%, obiectele supuse dezinfecției se lasă 60 min, apoi se spală cu apă curată sau se sterge cu o cîrpă umedă.

## **CONTINUTUL AMBALAJULUI**

Peroxid de hidrogen-MC soluție dezinfectantă 6%. Volumul nominal câte 40mle, 50 mle, 100mle, 200 mle, 500 mle, 1000 mle, 2000 mle, 3000 mle, 4000 mle, 5000 mle, în damigeana cu capac sau flacoane de sticlă sau masă plastică de culoare oranj(brună) cu gât elicoidal închis cu / sau fără dopuri din polietilenă și cu căpăcele din masă plastică (capac din polietilenă, capac din aluminiu). Câte un flacon împreună cu/sau fără prospectul pentru utilizator se ambalează în cutie individuală. Se admite ambalarea flacoanelor în/ sau fără cutie colectivă, fară ambalarea lor în cutie individuală.

## **PĂSTRARE**

A se păstra la temperatura sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

A se păstra departe de surse de căldură,suprafețe fierbinți , scânteii, flăcări și alte surse de aprindere.

## **TERMEN DE VALABILITATE**

2 ani.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

## **DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI**

Octombrie 2023

## **DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI**

„MC Pharmaceuticals” SRL, Republica Moldova  
MD - 2037, mun. Chișinău, str. Industrială, nr. 59/3,  
e-mail: office@mcpharma.md,  
tel: 068051605.

*Însoțiti orice reclamație cu numărul de serie înscris pe ambalaj!*

