

VIROCID

Dezinfectant concentrat cu spectru larg

COMPOZIȚIE: Fiecare litru are în compoziție următoarele:

Clorură de alchildimetilbenzil-amoniu	170,60 g
Clorură de didecildimetil-amoniu	78,00 g
Glutaraldehidă	107,25 g
Alcool - isopropanol	146,25 g
Derivați de terebentină - Ulei de pin.....	20,00 g

PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE:

VIROCID are un spectru larg de activitate împotriva bacteriilor gram-pozitive și gram-negative (inclusiv sporulate și nesporulate), virusuri, fungi, drojdii, mucegaiuri și alge, chiar și în prezența unor substanțe organice. Dezinfectantul este foarte economic de utilizat. Caracterizat printr-o atitudine atentă la suprafața tratată, stabilitate ridicată și siguranță în utilizare. Soluțiile sale de lucru sunt neutre și nu este agresiv.

VIROCID este eficient împotriva la **VIRUSURI:** Parvovirus, Hepatite (Hepatita A, B, C și E), Virusul bolii Carré, Virusul gripal (Influența), Herpes virus (Herpes tip 1 și 2), Bronșita infecțioasă, Parvovirus (tip paramixovirus 1 și 3) Virusul gripei aviare (Newcastle), Adenovirus.

VIROCID este eficient împotriva la **BACTERII:** Salmonella, Escherichia Colli, Leptospiroza, Streptococcus, Pseudomonas, Klebsiella, Chlamydia, Staphylococcus aureus, Proteus Vulgaris.

VIROCID este eficient împotriva la **FUNGI:** Candida albicans, Aspergillus, Mycosporum, Trichophyton, Saccharomyces Cerevisiae, Oidium lactis.

VIROCID este un agent de curățare eficient, prezența glutaraldehidă asigură un efect de dezodorizare (elimina mirosul de urină și amoniac în adăpostul pentru animale).

DESCRIERE: Dezinfectant, bactericid, virucid și fungicid.

INDICAȚII DE UTILIZARE:

- pentru dezinfecția suprafețelor (pereți și podele) în spitale și alte spații pentru îngrijirea sănătății;
- pentru dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și ustensilelor în halele pentru creșterea animalelor, în cabinete și clinici veterinare;
- pentru dezinfecția asupra mijloacelor de transport care sunt utilizate pentru transportul animalelor și transportul produselor alimentare, abatoare, incubatoare;
- pentru dezinfecția, echipamentelor și ustensilelor în industria alimentară, piscicultură și industria de preparare a furajelor;

MOD DE APLICARE:

I. Pentru dezinfecția suprafețelor (pereți și podele) în spitale și alte spații pentru îngrijirea sănătății:

- 1) Suprafețele vor fi curățate cu un detergent CID LINES;
- 2) După clătirea suprafeței și uscarea acesteia se va aplica VIROCID în concentrație de 0.25% - 0.5% (1:400 - 1:200) prin pulverizare (1L de soluție pe 4 m²).

II. Pentru dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și ustensilelor în halele pentru creșterea animalelor, în cabinete și clinici veterinare:

- 1) Utilizând un detergent CID LINES se va curăța manual sau mecanic zonele unde va fi aplicat produsul pentru a se îndepărta toate depunerile;
- 2) După clătirea suprafeței și uscarea acesteia se va aplica VIROCID în concentrație de 0.25% - 0.5% (1:400 - 1:200) prin pulverizare (1L de soluție pe 4 m²). Pentru adăposturile de animale utilizând un dispozitiv de creare a aerosolilor se vor utiliza 1-2 L VIROCID în 4 L de apă pentru 1000 m³.

III. Pentru dezinfecția încălțăminte se va utiliza VIROCID în concentrație de 1% (1:100) iar soluția va fi schimbată de 2-3 ori pe săptămână.

IV. Pentru dezinfecția asupra mijloacelor de transport care sunt utilizate pentru transportul animalelor:

- 1) Mijloacele de transport vor fi curățate inițial cu un detergent CID LINES;
- 2) După clătire se va aplica VIROCID în concentrație de 0.5% prin pulverizare. Pentru dezinfectoarele rutiere se va utiliza VIROCID în concentrație de 1% (1:100).

V. Pentru dezinfecția suprafețelor (pereți și podele), echipamentelor și ustensilelor în industria alimentară și industria de preparare a furajelor:

- 1) Inițial vor fi curățate cu un detergent CID LINES;
 - 2) După clătirea suprafeței și uscarea acesteia se va aplica VIROCID în concentrație de 0.25% - 0.5% (1:200) prin pulverizare (1 L de soluție pe 4 m²);
 - 3) Se lasă în contact timp de 20 de minute după care se clătește.
- VI. Pentru dezinfectia mijloacelor de transport care sunt utilizate pentru transportul produselor alimentare:**
- 1) Mijloacele de transport vor fi curățate inițial cu un detergent CID LINES;
 - 2) După clătirea suprafeței și uscarea acesteia se va aplica VIROCID în concentrație de 0.25% - 0.5% (1:200) prin pulverizare (1 L de soluție pe 4 m²);
 - 3) Se lasă în contact timp de 15 de minute după care se clătește.
- VII. Ouă, pardoseli, pereți, incubatoare și alte echipamente.**
- Ouă: VIROCID: max. 0,25% pulverizare pe ouă (în țările în care acest lucru este permis).
- VIII. Camere goale, mașinile de incubare goale, echipamente, containere pentru subproduse, încăperi sanitare:**
- Spray: VIROCID : 0,25% - 0,5%.
 - Spumare: VIROCID: 0,25% - 0,5%
 - Aerosoli: 1- 2L VIROCID + 4 litri de apă / 1000 m³.
- Prelucrarea dulapurilor de ecloziune se va efectua prin aerosoli: 50 ml VIROCID + 250 ml apă / 100 m³. Prelucrarea prin aerosoli a dulapurilor de ecloziune în procesul de producție: (este permisă de asemenea îndată după încărcarea ouălelor) : 0,01% - 0,25% VIROCID .
- IX. Pentru îngrijire personală - dezinfectia de îmbrăcăminte:**
- Adauga 0,25-0,5% la începutul ciclului de spălare.
- X. Pentru a dezinfecta paiele din grajd, trebuie de urmat indicațiile pas cu pas, programul de sănătate prevede respectarea normelor de bază a sistemului de management al siguranței alimentelor:**
1. Goliți dispozitivele de alimentare și / sau demontarea echipamentului.
 2. Aplicați curățare uscată (elimina gunoiul de paie și praf, curățați gunoiul de grajd ...).
 3. Aplicați detergent alcalin (pentru îndepărtarea grăsimii și a proteinei); dacă este necesar se clătește detergent acid.
 4. Se clătește și se lasă să se usuce.
 5. Dezinfectați cu VIROCID prin (Spray, spumă sau aerosol).
 6. Se assemblează echipamentul demontat + se acoperă podeaua cu așternut de paie proaspete.
 7. Dezinfectia așternutului:
 - Utilizarea de aerosol încălzit: 1 - 2 L VIROCID + 4 litri de apă / 1000 m³
 - Spray 0,25% VIROCID. Umeziți așternut de paie, fără de impregnare continuă.
- Notă: În cazul pardoselilor murdare, acoperite cu așternut de paie utilizate: spray de 0,5% VIROCID.

REAȚII ADVERSE

Evitați contactul direct cu pielea membranele și mucoasele ochiului, are acțiune iritantă și un efect de sensibilizare.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate la medicament.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE

A nu se lăsa la îndemîna copiilor și persoanelor neautorizate!

Pentru a lucra cu VIROCID nu este permis femeilor însărcinate și care alăptează, persoanele cu vârsta sub 18 ani, persoanelor neautorizate și persoanelor ce au contraîndicații pentru utilizarea cu dezinfectante.

În timpul manipulării cu VIROCID persoanele trebuie să fie îmbrăcate în echipament de protecție: (salopetă, mănuși de cauciuc, mască de gaze și ochelari de protecție). În timpul lucrului este interzis fumatul, băutul și mîncatul. Atunci când se pregătește soluțiile de lucru trebuie evitate pulberile care se încadrează pe piele, ochi și sistemul respirator. La sfârșitul lucrului mâinile și fața trebuie să fie spălate cu apă caldă și săpun, clătiți gura cu apă curată.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra în loc uscat, în ambalajul original, bine închis, la temperatura mai mică de 25°C, protejat de lumina directă, protejat de surse de căldură și ferit de îngheț. Păstrați-l departe de alimente, băuturi și furaje animale.

MOD DE PREZENTARE: Flacoane de 100 ml, 1000 ml și 10 L.

Producător: CID LINES BV- The Professional Hygiene Company, Belgia.

Distribuitor: S.A "Farmavet", MD-2059, Republica Moldova, Chișinău, Petricani 198. Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax: 31-72-68;

Для предъявления по месту требования

Настоящим письмом подтверждаем, что Вироцид® можно использовать для дезинфекции материалов, оборудования, полов, стен, мебели, ванных комнат, сантехники,.... и как для частного/ личного характера, так и в секторе здравоохранения *.

Пожалуйста, всегда используйте продукт в соответствии с инструкцией по применению, где можно найти краткое описание (см ниже:)

Рекомендации по применению:

Для дезинфекции всех материалов в больницах, медицинских учреждениях или общественных местах:

Разведение: 1: 400 - 1: 200 (0,25% -0,5%)

Обработать все поверхности готовым раствором Вироцид®, используя крупнокапельный спрей, губку или швабру.

Поверхности должны оставаться влажными в течение 10 минут.

Не используйте оборудование, пока раствор не впитается и поверхности не высохнут.

Примечание: Вироцид® нельзя использовать в качестве заключительного стерилизатора на любой поверхности или инструменте, который вводится непосредственно в организм человека или контактирует со слизистыми оболочками.

* Пожалуйста, ознакомьтесь с свидетельством о государственной регистрации для получения более подробной информации.

С уважением,
СИД ЛАЙНС НВ.

CID LINES

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper - Belgium
Tel: +32 (0) 57 21 78 77
Fax: +32 (0) 57 21 78 79
info@cidlines.com - www.cidlines.com
BTW: NL 0435 972 955 TVA

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper - Belgium
T+32(0)57 21 78 77 | F+32(0)57 21 78 79
www.cidlines.com

WE
MAKE
HYGIENE
WORK

CID LINES