

K-Othrine

Informații cheie

- Gândaci
- Purici, căpușe
- Plosnițe, furnici, larve
- Muște, țânțari, viespi

Compoziție

- Deltametrin: 2,5 g (2,5%) ~ 25 g/l

Formulare

Suspensie concentrată

Unde poate fi utilizat

- Locuințe individuale (apartamente, vile, case de vacanță etc.)
- Spitale, clinici, hoteluri, restaurante, școli, grădinițe, azile de bătrâni, depozite, locații unde se prepară și se servesc alimente
- Depozite, indiferent de tipul de material sau produse alimentare depozitate
- Zone urbane, parcuri, spații de locuit și recreere

Metode de acțiune

Acționează prin contact și ingestie, pătrunzând rapid în stratul de chitina al insectelor, paralizând sistemul lor nervos și ducând la moartea acestora.

Ambalaj

Flacon 1 l

Categorii de utilizatori

Profesioniști, populație

Avantaje competitive

- Toxicitate extrem de scăzută pentru organismele non-țintă
 - Biodegradabil
 - Nu este inflamabil
 - Nu lasă pete sau urme vizibile după aplicare
-

VARAT GRANULE 200 GR

Granulele rodenticide **Varat** sunt un produs convenabil pentru combaterea șobolanilor și șoarecilor. Substanța activă este **brodifacum (0,005%)**.

Momeala este sub formă de pelete compacte, de culoare roz, și este disponibilă în două variante de ambalare:

- pachete de 100 g, ambalate în cutii din carton ondulat de 50 buc.
Produsul este destinat utilizării în gospodării și poate fi folosit pentru combaterea șobolanilor și șoarecilor în apartamente, case de vacanță sau grădini. Efectul rodenticidului devine vizibil în **3–8 zile**.
Avantajele granulelor „Varat”:
- **Brodifacum** este un rodenticid cu acțiune unică, doza letală putând fi ingerată de rozătoare într-o singură masă;
- Gradul de consum al momelii este aproape de **100%** datorită atractanților incluși, care o fac mai preferabilă decât alte surse de hrană;
- Peletele sunt rezistente la umezeală, păstrându-și proprietățile pentru o perioadă îndelungată;
- Conțin un anticoagulant cu acțiune întârziată, astfel încât rozătoarele nu pot asocia consumul momelii cu moartea altor rozătoare, eliminând riscul de evitare a momelii.

Mod de utilizare și măsuri de precauție:

În spații interioare, momeala se plasează în colțuri ascunse, lângă vizuini sau pe traseele de deplasare ale rozătoarelor, în porții de **5–20 g** pe suporturi sau în stații de intoxicare.

În exterior, momeala poate fi amplasată direct în vizuini, pe traseele șobolanilor sau în diverse adăposturi. Verificați amplasarea momelii după **2 zile** și completați acolo unde a fost consumată.

Manipulați rodenticidul folosind mănuși de cauciuc, pentru a evita contactul direct cu substanța toxică și pentru a nu îndepărta rozătoarele cu mirosul uman.