

Instructiune pentru administrare

**Soluție de clorură de sodiu 0,9% injectabilă**

**Descriere:**

Soluție incoloră, transparentă, fără miros, cu gust sărat.

Adjuvanți: apă pentru injecții.

**Acțiune farmacoterapeutică:**

**ATC vet cod QB05 – soluții perfuzabile și substituenți ai sîngelui.(QB05XA03).**

Acțiunea farmacodinamică a preparatului se datorează prezenței ionilor de sodiu și ioni de clorură. Ionii de sodium penetreză membrana celulară prin intermediu diferitor mecanisme de transportare, printre care o mare importanță are pompa de sodium-potasiu (Na-K-ATFaza). Sodiu joacă un rol important în transmiterea semnalului în neuroni, procesele electrofiziologice a inimii, în procesele metabolice renale; se elimină preponderent cu urina și în aşa mod are loc reabsorbția sodiului (reabsorbția renală). O cantitate mică de sodiu se elimină din organism cu masele fecale și prin transpirație.

Soluția de preparat ia parte activă în echilibrul hidroelectrolitic, menține și regleză presiunea osmotica, posedă acțiune de rehidratare și detoxifiere, acoperă necesarul de sodiu în diferite patologii și temporar îmărește volumul lichidului din circuitul sanguin.

**Indicații:**

Se indică în tratamentul animalelor pentru rehidratarea organismului în urma intoxicărilor, intervențiilor chirurgicale, arsurilor, dispepsiei, scăderea tensiunii sanguine, în stări de soc. Pentru sanarea plăgilor, cavităților nazale și bucale, conjunctivei și a. Poate fi utilizat ca diluant al preparatelor medicamentoase și a biopreparatelor.

**Dozaj și mod de administrare:**

Preparatul poate fi administrat i/venos, i/muscular și subcutan în doză de ml/animal:

VMC – 500- 3000;

Ovine, caprine – 100-300;

Porcine – 10-150 ;

Câini – 10-40;

Înainte de administrare preparatul se încălzește pînă la  $T^0 +35+38^0C$ .



**Contraindicații:**

Este contraindicată administrarea intravenoasă a preparatului în doze maximale în cazul dereglărilor circulației sanguine și în cazul pericolului de edem pulmonar sau cerebral.

**Precauții:**

În cazul administrării subcutane, în locul ijectării poate apărea o umflătură care se reabsoarbe peste 2-3 ore.

**Mod de prezentare:**

Flacoane din sticlă a căte 8; 16; 50; 100 ; 200 și 400 ml, flacoane din polietilenă a căte 100 ml.

**Condiții de păstrare:**

La loc uscat, ferit de lumină, la  $T^0 +2+25^0C$ .

**Valabilitate:**

3 ani.

**Pentru uz veterinar!**

**Producător:** OOO “ Brovafarma” ( Ucraina),bul. Nezavisimosti 18<sup>o</sup>, or.Brovărî, reg. Kiev,07400

**Distribuitor în R.Moldova:** SRL “Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4A,  
tel/fax +373 022 855-073; tel +373022 855 071

