

Листок-вкладыш

Название ветеринарного препарата

Вакцина живая споровая против сибирской язвы животных из штамма "СБ" жидкая.

Состав

1 см³ вакцины содержит:

Жизнеспособных спор безкапсульной авирулентной культуры *Bacillus anthracis* штамма "СБ" 20-25 млн;

- 30% глицерине на фосфатно-буферном растворе -30 ± 3 %

Фармацевтическая форма

Прозрачная, несколько опалесцирующая беловато-желтоватая суспензия с незначительным беловатым осадком, образующимся при хранении и легко разбивается в гомогенную суспензию при встряхивании.

Иммунобиологические свойства

Используют для создания иммунитета против сибирской язвы у сельскохозяйственных животных.

Иммунитет у животных наступает через 10 дней после прививки и сохраняется в течение не менее 12 месяцев.

Вид животных

Лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, пушные звери, свиньи.

Показания к применению

Вакцину применяют однократно для профилактической и вынужденной иммунизации лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз, пушных зверей, свиней.

Молодняк всех видов, кроме жеребят, первый раз прививают с 3-х месячного, жеребят с 9-ти месячного возраста. Повторно молодняк ревакцинируют через 6 месяцев после первой вакцинации.

Взрослых животных иммунизируют 1 раз в год.

Вынужденные прививки проводят в любой период года независимо от наличия в хозяйствах острых инфекционных болезней.

Противопоказания

Запрещается планово прививать молодняк до 3-х месячного возраста, ослабленных, истощенных животных и самок в последний месяц беременности, а также при наличии в хозяйствах острых инфекционных болезней.

Не допускается проведение плановых прививок животных клинически больных, с повышенной температурой тела.

Меры предосторожности при использовании

При применении вакцины соблюдать ветеринарно-санитарных правил.

