

## Anexa 7

# INSTRUCȚIUNE PENTRU UTILIZARE

## SANIDEZ

### dezinfectant pentru mâini

#### Denumirea comercială:

Sanidez

#### Compoziția:

100 ml soluție conține: peroxid de hidrogen 3% - 4,17 ml, alcool etilic 96% - 83,33 ml, glicerol și apă purificată.

Proprietăți fizico-chimice: soluție limpede, transparentă, incoloră, cu miros de alcool etilic.

#### Domeniul și aria de utilizare:

Produsul "SANIDEZ" este preconizat pentru utilizarea în domeniul sănătății publice, profesionist și de uz casnic. Destinat pentru dezinfectarea mâinilor (persoanelor ce activează/vizitează laboratoarele medicale, policlinici, spitale, centre și întreprinderi medico - sanitare, saloane de frumusețe, spa saloane, fitness cluburi, transport public, magazine alimentare și nealimentare și în alte spații publice).

Pentru tratarea miinilor preoperatorie se vor efectua 3-5 aplicari pentru o perioada de 3-5 minute.

Pentru procedurile operatorii ce dureaza mai mult de 2 ore se v-a efectua o a doua tratare cu timpul de expunere - de 1 minut.

#### Mod de utilizare:

Dezinfectarea mâinilor: mâinile trebuie să fie curate și uscate, se frecționează suprafața mâinilor cu 3 ml soluție nediluată timp de 1 minut, până la uscarea completă.

Produsul posedă activitate bactericidă împotriva bacteriilor gram negative (*Pseudomonas aeruginosa*) și gram pozitive (*Staphylococcus aureus*), levuricidă (*Candida albicans*).

#### Pericole pentru sănătate:

Inhalarea vaporilor pentru o perioadă îndelungată de timp provoacă simptome tipice consumului de alcool etilic, iritarea căilor respiratorii, manifestând efect narcotic.

La contactul direct cu ochii provoacă lezarea gravă/iritarea acestora.

Manipularea produsului în încăperi lipsite de ventilare, în apropierea focului sau a scânteielor, prezintă pericol de incendiu.

### **Măsuri de prim ajutor:**

Se va ține cont ca produsul este inflamabil și se va elimina îmbrăcămintea contaminată. Dacă ați inhalat vapori pentru un timp îndelungat și nu vă simțiți bine apălați medicul. Aerisiți încăperea, dacă simptomele persistă, consultați imediat medicul.

După contactul cu ochii, clătiți din abundență cu apă proaspătă și curată, timp de cel puțin 10 minute. La apariția iritațiilor consultați un medic oftalmolog.

### **Măsuri împotriva pierderilor accidentale:**

Precauții individuale: Evitarea inspirării și contactul cu ochii. Îndepărtarea surselor de scânteii.

Măsuri de curățare: Puneți în containere adecvate pentru eliminare. Ventilați zona afectată. Resturile se vor colecta cu material absorbant pentru lichide (nisip, diatoni, absorbant universal).

Precauții privind mediul ambiant: Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane. Proprietăți explozive. La diluare se permite eliminarea în canalele de scurgere.

### **Controlul expunerilor/protecție personală:**

În cazul unor lucrări industriale se va purta costum complet de protecție confecționat din materiale impermeabile pe baza de poliester sau acril, cizme, șort, pentru a preveni contactul cu pielea. Se vor evita echipamentele confecționate din lână, bumbac sau piele. Purtați ochelari și/sau viziere de protecție chimică. Se vor utiliza mănuși de protecție chimică din cauciuc butilic sau PVC.

### **Precauții:**

Prudență!

Poate provoca iritații ale tractului respirator, digestive și a ochilor.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scânteii.

Luăți măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.

A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

Păstrați recipientul închis etanș.

A se proteja de lumina solară.

Nu utilizați ambalajul pentru alte scopuri.



### **Prezentare ambalaj:**

Flacon din polietilenă cu capacitatea de 50ml, 100ml, 200ml, 500ml, 1000 ml, 5000 ml și 10000 ml, închis cu căpăcel din polietilenă înzestrat cu sistem de închidere cu sigiliu.

**Păstrare:**

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și la temperaturi sub 25 °C.

**Termen de valabilitate:**

2 ani.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate.

**Denumirea și adresa producătorului:**

S.R.L “ElaDum Pharma”, MD-3715, str. Centenarului 2/C, s. Cojușna, r-ul Strășeni, Republica Moldova, tel./fax: 0237 42 927/42 408.