

INSTRUCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA PRODUSELOR DE DERATIZARE ȘI DEZINSECȚIE

1. Introducere Prezentele instrucțiuni au scopul de a reglementa utilizarea produselor de deratizare și dezinsecție în conformitate cu normele de siguranță și reglementările în vigoare. Se descriu caracteristicile produselor utilizate, metodele de aplicare și măsurile de precauție necesare.

2. Produse utilizate

2.1 Ratimor Brodifacoum Soft Bait

Producător: Unichem, Slovacia

Descriere: Rodenticid formulat pentru combaterea eficientă a șoarecilor și șobolanilor. Conține substanța activă brodifacoum și este îmbogățit cu uleiuri și grăsimi pentru a menține atractivitatea pe termen lung. Include agenți de stabilizare și un agent amar pentru reducerea riscului de ingerare accidentală.

Avantaje:

- Eficacitate ridicată chiar și în doze mici;
- Formulă stabilă, cu efect de lungă durată;
- Potrivit pentru medii cu surse naturale de hrană pentru rozătoare;
- Acțiune întârziată pentru o eliminare eficientă;
- Siguranță sporită prin conținutul de agent amar.

Mod de utilizare:

- **Pentru șoareci (*Mus musculus*):**
 - Dozaj: 10-20 g de momeală la intervale de 2-5 metri;
 - Monitorizare periodică și realimentare în funcție de consum.
- **Pentru șobolani (*Rattus norvegicus* și *Rattus rattus*):**
 - Dozaj: 10-60 g de momeală la intervale de 5-10 metri;
 - Verificare regulată și înlocuire a momelei consumate.

2.2 Fendona® 6 SC

Producător: BASF, Germania

Descriere: Insecticid cu spectru larg destinat tratamentelor de dezinsecție în spații interioare și exterioare. Asigură un efect rapid și persistent împotriva insectelor sinantropice.

Beneficii:

- Acțiune rapidă și eficiență ridicată;
- Persistență îndelungată pe suprafețele tratate.

Mod de utilizare:

- **Pregătirea soluției de lucru:**

- Se utilizează conform dozajului recomandat;
- Se diluează în apă curată, la temperatura camerei.

- **Aplicare:**

- Se utilizează pulverizatoare profesionale de înaltă presiune;
- Suprafața tratată se monitorizează și se reîmprospătează tratamentul la nevoie.

Doze recomandate:

- **Pentru gândaci de bucătărie:**

- 40 ml preparat la 1 litru de apă;
- Consumul soluției: 50 ml/m² pentru suprafețe netede, 100 ml/m² pentru suprafețe poroase.

- **Pentru purici, muște, furnici:**

- 20-40 ml preparat la 1 litru de apă;
- Consumul soluției: 50-100 ml/m², în funcție de tipul suprafeței tratate.

3. Precauții și măsuri de siguranță aplicate

- Produsele trebuie utilizate doar de către personal instruit;
- Se respectă normele de protecție a muncii și instrucțiunile de siguranță specifice fiecărui produs;
- Produsele se depozitează în locuri sigure, ferite de umiditate și lumină directă;
- Se evită contactul cu pielea, ochii și ingerarea accidentală;
- Se respectă regulile de eliminare a deșeurilor rezultate în urma utilizării produselor.

4. Concluzie Prezentele instrucțiuni sunt elaborate pentru descrierea procedurii și a asigura utilizarea corectă și în siguranță a produselor de deratizare și dezinsecție.