

# ROZATICID

Momeală pentru nimicirea șoarecilor și șobolanilor

**COMPOZIȚIE:** Boabe de grâu .....1000,0 g

Bromadiolon.....22,0 ml

## CARACTERISTICI

ROZATICID este o momeală rodenticidă gata de utilizare ce conține o substanță activă anticoagulantă, cunoscută sub numele de bromadiolon, eficientă împotriva șoarecelui de casă (*Mus musculus*), a Șobolanului cenușiu (*Rattus norvegicus*) și a șobolanului negru (*Rattus rattus*). Conține Bromadiolon, cel mai folosit anticoagulant în lupta împotriva șoarecilor și șobolanilor. Este o momeală realizată din cereal ce reprezintă o soluție eficientă și economică. Toate rozătoarele consumă cereale, ca atare momeala poate fi folosită în spații interioare sau exterioare și poate fi pusă cu ajutorul dozatoarelor direct în găurile făcute de șoareci sau șobolani. Formula pe bază de semințe de grâu este deosebit de atractivă pentru orice tip de rozătoare.

## FARMATOXICOLOGIE :

Bromadiolon face parte din grupul 2 de substanțe deosebit de periculoase. Acționează ca anticoagulant și inhibă formarea protombinei în ficat, totodată distrugând și pereții capilarelor, rozătoarele mor ca urmare a hemoragiei interne. După ingerare, moartea se produce lent și fără durere, ceea ce este foarte avantajos, deoarece populația rozătoarelor nu se alarmează.

Este un toxic pentru șobolani și șoareci, relativ toxic pentru celălalte animale și om. Datorită acțiunii lente a toxicidului este timp suficient pentru administrarea antidotului, Vitamina K1.

## MOD DE UTILIZARE:

ROZATICID este potrivit pentru a fi utilizat în interiorul locuințelor, garaje, beciuri, cămari și alte zone în aer liber.

Momeala rodenticidă trebuie introdusă într-un recipient corespunzător, protejată împotriva agenților atmosferici, a înghițirii de către speciile nevizate și a răspandirii în mediul înconjurător. Observați zona de infestare și amplasați recipientele cu momeala în cuiburi, pe traseele de circulație ale rozătoarelor și în locurile frecventate de acestea.

- Pentru șobolani folosiți maxim 50-100 g de momeală pentru un loc. Amplasați momeala la o distanță de 10 m și reduceți la 5 m în caz de infestare severă. Nu mișcați sau deranjați locurile în care este amplasată momeala timp de câteva zile. Dacă nu se observă semne de activitate după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate crescută.
- Pentru șoareci folosiți 20 – 40 g de momeală pentru un loc. Amplasați momeală din 5 în 5 metri; reduceți la 2 m în caz de infestare severă. Șoarecii sunt foarte curioși și pentru eficacitatea tratamentului poate fi util să mutați momeala la fiecare 2-3 zile, atunci când punctele de momeală sunt verificate și/sau reîncarcate.

Moartea survine la câteva zile de la ingestie, de obicei la 4-10 zile. Rozătoarele muribunde sau moarte și momeala neconsumată trebuie strânse imediat și arse sau îngropate.

## Măsuri de precauție

Utilizați instrumentul numai pentru scopul propus. Păstrați închis în ambalajul original.

Cu instrumentarul de îngrijire ar trebui adoptate pentru a proteja copiii și animalele de companie de contact posibil cu momeala. Spațiu de stocare și utilizare momeli trebuie să fie inaccesibile pentru copii și animale de companie.

În timp ce se lucrează cu instrumentarul nu se fumează, nu se bea, nu se mănâncă, mâinile se vor proteja cu mănuși de cauciuc.

Nu atingeți momeala cu mâinile goale. În timpul aplicării momelii se va efectua cu o lingură de plastic de unică folosință sau mâinile protejate de mănuși de cauciuc.

În cazul că ați contactat cu pielea și după orice lucrare cu otrava se spală bine zona cu apă și săpun.

Nu amplasați momeala în apropierea lacurilor de acumulare și a surselor de apă.

Persoanele care locuiesc sau lucrează în încăperile tratate, trebuie informate cu privire la prezența rodenticidului și necesitatea de a respecta măsurile de siguranță. Rozătoarele moarte, resturile de momeală și de ambalaje goale se distrug prin ardere. Nu aruncați resturile în canalizare, fonduri de canalizare sau canale navigabile.

În caz de contact accidental cu stomacul înseamnă că trebuie să dea lichide victimei mai multe pahare de apă, apoi se induce voma. Procedura se repetă de 2 ori, apoi luați 10-15 comprimate zdrobite de cărbune activat cu 1 pahar de apă și să ia un laxativ salin.

*Adresați-vă urgent la medic! Antidotul – Vitamina K1 (fitomenadion).*

**Prezentare:** Pungi de 200g.

**Păstrare:** Păstrați produsul în ambalajul original, departe de alimente, băuturi, hrana pentru animale și substanțe cu mirosuri puternice, la o temperatură cuprinsă între 15 °C până la + 30 ° C, într-un loc uscat, întunecos, nu lăsa-ți la îndemâna copiilor și a animalelor. La loc uscat, ferit de lumină, la temperatura până la 25°C

**PRODUCĂTOR:** SA "Farmavet", MD-2059, Republica Moldova, Chișinău, Petricani 198.

Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax: 31-72-68; 079773340

[www.farmavet.md](http://www.farmavet.md) email: farmavet2017@gmail.com