

Specificație Tehnică F.4.1

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1638279644471 din 04.12.2021

Obiectul achiziției: Reagenți pentru realizarea proiectului de cercetare „Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST, precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvasculară „

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
STA Liatest FM, Reactiv pentru determinarea monomerului fibrinei	STA Liatest FM 00543	France	Diagnostica Stago	Reactiv nesensibil la următoarele substanțe: hemoglobină (până la 5 g / l), bilirubină (până la 200 mg / l), nefracționată heparină (până la 1 UI / ml), heparină cu greutate moleculară mică (până la 2 anti-XaUI / ml). Măsurată prin metoda imuno turbidimetrică. 6x4ml, compatibili cu Analizator STA 58606/39	Reactiv nesensibil la următoarele substanțe: hemoglobină (până la 5 g / l), bilirubină (până la 200 mg / l), nefracționată heparină (până la 1 UI / ml), heparină cu greutate moleculară mică (până la 2 anti-XaUI / ml). Măsurată prin metoda imuno turbidimetrică. 6x4ml, compatibili cu Analizator STA 58606/39	
STA STACHROM AT III Reactiv pentru determinarea activității antitrombinei III	TA STACHROM AT III 3, 00596	France	Diagnostica Stago	Reactiv pentru determinarea concentrației D-Dimerului Metoda imunoturbidimetrică; rezultatele nu sunt afectate de hemoliză (hemoglobină până la 2 g / l), icter (bilirubină conjugată până la 290 mg / l, bilirubină neconjugată până la 200 mg / l), heparină nefracționată până la 2 UI / ml, heparină cu greutate moleculară mică până la 2 UI anti-Xa / ml. Eliminarea emboliei pulmonare - sensibilitate 97%, specificitate 75,5%, VAN 99,7%; stabilitatea reactivului după deschidere / preparare timp de 15 zile. Metodologia STA Liatest D-di plus . 6x6 ml, compatibili cu Analizator STA 58606/39	Reactiv pentru determinarea concentrației D-Dimerului Metoda imunoturbidimetrică; rezultatele nu sunt afectate de hemoliză (hemoglobină până la 2 g / l), icter (bilirubină conjugată până la 290 mg / l, bilirubină neconjugată până la 200 mg / l), heparină nefracționată până la 2 UI / ml, heparină cu greutate moleculară mică până la 2 UI anti-Xa / ml. Eliminarea emboliei pulmonare - sensibilitate 97%, specificitate 75,5%, VAN 99,7%; stabilitatea reactivului după deschidere / preparare timp de 15 zile. Metodologia STA Liatest D-di plus . 6x6 ml, compatibili cu Analizator STA 58606/39	

STA STACHROM PROTEIN C, Reactiv pentru determinarea proteinei C	STA STACHROM PROTEIN C, 00671	France	Diagnostica Stago	Reactiv pentru testul de screening anticoagulant al lupusului. Metoda cronometrică se bazează pe utilizarea otrăvii de cărbune, Russell, diluate. Nesensibilă la heparina nefracționată 0,8 UI / ml. 12x5ml, compatibili cu Analizator STA 58606/39,	Reactiv pentru testul de screening anticoagulant al lupusului. Metoda cronometrică se bazează pe utilizarea otrăvii de cărbune, Russell, diluate. Nesensibilă la heparina nefracționată 0,8 UI / ml. 12x5ml, compatibili cu Analizator STA 58606/39,	
STA LIATEST FREE PROTEIN S 2ML, Reactiv pentru determinarea proteinei S	STA LIATEST FREE PROTEIN S 2ML 00527	France	Diagnostica Stago	Reactiv pentru testarea confirmativă a anticoagulantelor lupice. Metoda cronometrică se bazează pe utilizarea otrăvii de cărbune Russell, diluate. Nesensibilă la heparina nefracționată 0,8 UI / ml , 12x2 ml, compatibili cu Analizator STA 58606/39	Reactiv pentru testarea confirmativă a anticoagulantelor lupice. Metoda cronometrică se bazează pe utilizarea otrăvii de cărbune Russell, diluate. Nesensibilă la heparina nefracționată 0,8 UI / ml , 12x2 ml, compatibili cu Analizator STA 58606/39	

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Nicolai Iasîbaş În calitate de: Director

Ofertantul: Lokmera SRL Adresa: str.Mitropolit Gurie Grosu 9, Chisinau, Republica Moldova, MD 2028

Specificație Tehnică F.4.1

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1638279644471 din 04.12.2021										
Obiectul achiziției: Reagenți pentru realizarea proiectului de cercetare „Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST, precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvasculară „										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	STA Liatest FM, Reactiv pentru determinarea monomerului fibrinei	set	1	20326,00	24391,20	20326,00	24391,20	30 de zile		
	STA STACHROM AT III Reactiv pentru determinarea activității antitrombinei III	set	1	12424,00	14908,80	12424,00	14908,80	30 de zile		
	STA STACHROM PROTEIN C, Reactiv pentru determinarea proteinei C	set	1	34266,00	41119,20	34266,00	41119,20	30 de zile		
	STA LIATEST FREE PROTEIN S 2ML, Reactiv pentru determinarea proteinei S	set	1	15589,00	18706,80	15589,00	18706,80	30 de zile		
	TOTAL					82605,00	99126,00			

Semnat: Numele, Prenumele: Nicolai Iasibaș În calitate de: Director
Republica Moldova, MD 2028

Ofertantul: Lokmera SRL Adresa: str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chisinau,

