

suprafețe

dezinfecția apă

bucătărie

falanță sanitară

**HMI® TABIDEZ 56**

01/2012

**PREPARAT CONCENTRAT PENTRU DEZINFECȚIE****COMPOZIȚIE:**

Substanță activă: diclorizocianurat de sodiu 99% (56% clor activ).

**SPECTRUL DE ACȚIUNE:**

HMI® TABIDEZ 56 are o acțiune activă bactericidă, tuberculocidă, fungică (C. Albicans, A. niger), virocidă (HIV, Hepatitis A (HAV); Hepatitis B (HBV); Hepatitis C (HCV), Rota, Herpes, H5N1, H1N1, Adenovirus), sporicidă, algică.

**INDICAȚIE:**

Pentru dezinfecția suprafețelor în instituțiile medicale, în încăperile de producere și comercializare a produselor alimentare, în industria cosmetică și farmaceutică, veselei de bucătărie, sticlei de laborator, obiectelor de deservire a bolnavilor, dezinfecția oulelor, căldărilor de gunoi, deseuri medicale a barierilor de dezinfecție, utilajelor de producere în industria alimentară, farmaceutică, cosmetică. Stofei de culoare albă (lenjeriei, îmbrăcămintei de lucru e.t.c.) în instituțiile medicale, industriale și de comerț, apă potabilă, apa a bazinelor.

**SCHEMA PREPARĂRII ȘI UTILIZĂRII SOLUȚIILOR DE LUCRU:**

| MODUL DE UTILIZARE:                                                                                                                             | Concentrația:<br>granule /pastile<br>1 pastilă – 2,8 gr | EXPOZIȚIA: | SPECTRUL DE<br>ACȚIUNE:                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Suprafețe curate<br>prin ștergere.                                                                                                              | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă   | 5 min      | bactericidă                                                          |
| Suprafețele în instituțiile<br>medicale prin ștergere.                                                                                          | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă   | 20 min     | bactericidă, fungică<br>(cu grad înalt de infecție)                  |
|                                                                                                                                                 | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă   | 45 min     | tuberculocidă, virucidă<br>(cu grad scăzut de<br>infecție)           |
|                                                                                                                                                 | 4 g granule / 10 L apă<br>sau<br>2 pastile / 10 L apă   | 30 min     | tuberculocidă, virucidă,<br>sporicidă (cu grad înalt<br>de infecție) |
|                                                                                                                                                 | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă   | 5 min      | bactericidă (suprafețe<br>curate)                                    |
| Suprafețele care se află în<br>contact direct cu<br>produsele alimentare în<br>instituțiile medicale<br>prin ștergere cu clătire<br>ulterioară. | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă   | 20 min     | bactericidă, fungică<br>(cu grad înalt de infecție)                  |
|                                                                                                                                                 | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă   | 45 min     | tuberculocidă, virucidă<br>(cu grad scăzut de<br>infecție)           |
|                                                                                                                                                 | 4 g granule / 10 L apă<br>sau<br>2 pastile / 10 L apă   | 30 min     | bactericidă,<br>tuberculocidă, fungică,<br>virucidă, sporicidă       |
|                                                                                                                                                 | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă   | 5 min      | bactericidă (veselei<br>curate)                                      |
| Veselei de bucătărie în<br>instituțiile medicale<br>prin scufundare cu clătire<br>ulterioară.                                                   | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă   | 20 min     | bactericidă, fungică<br>(cu grad înalt de infecție)                  |
|                                                                                                                                                 | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă   | 45 min     | tuberculocidă, virucidă<br>(cu grad scăzut de<br>infecție)           |
|                                                                                                                                                 | 4 g granule / 10 L apă<br>sau<br>2 pastile / 10 L apă   | 30 min     | bactericidă,<br>tuberculocidă, fungică,<br>virucidă, sporicidă       |
|                                                                                                                                                 | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă   | 5 min      | bactericidă (veselei<br>curate)                                      |

Prin ștergere: 40-150 ml soluțiile /m<sup>2</sup> suprafețe.

I.C.S. "HMI-HIGIENED INDUSTRIE" S.R.L.

Sediul: MD-2068, str. Costin Miron, 7.

mun. Chișinău, Republica Moldova

tel./fax +373 22 430 922;

tel. +373 69 366 376; +373 69 355 788

e-mail: moldova@hmi-company.com



| MODUL DE UTILIZARE:                                                                                                                                  | Concentrația:<br>granule /pastile<br>1 pastilă – 2,8 gr                    | EXPOZIȚIA:               | SPECTRUL DE<br>ACȚIUNE:                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bariere dezinfectante.                                                                                                                               | 4 g granule / 10 L apă<br>sau<br>2 pastile / 10 L apă                      | 5 min                    | bactericidă                                                      |
| Faianța sanitară prin<br>ștergere.<br>Sticlei de laborator în<br>instituțiile medicale prin<br>înmuire cu clătire<br>ulterioare.                     | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă                      | 5 min                    | bactericidă (în condiții de<br>curățenie)                        |
|                                                                                                                                                      | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă                      | 20 min                   | bactericidă, fungicidă<br>(cu grad înalt de infecție)            |
|                                                                                                                                                      | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă                      | 45 min                   | tuberculocidă, virucidă<br>(cu grad scăzut de<br>infecție)       |
|                                                                                                                                                      | 4 g granule / 10 L apă<br>sau<br>2 pastile / 10 L apă                      | 30 min                   | bactericidă,<br>tuberculocidă, fungicidă,<br>virucidă, sporicidă |
| Obiectelor de deservire a<br>bolnavilor în instituțiile<br>medicale prin înmuire cu<br>clătire ulterioare.                                           | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă                      | 5 min                    | bactericidă (în condiții de<br>curățenie)                        |
|                                                                                                                                                      | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă                      | 20 min                   | bactericidă, fungicidă<br>(cu grad înalt de infecție)            |
|                                                                                                                                                      | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă                      | 45 min                   | tuberculocidă, virucidă<br>(cu grad scăzut de<br>infecție)       |
|                                                                                                                                                      | 4 g granule / 10 L apă<br>sau<br>2 pastile / 10 L apă                      | 30 min                   | bactericidă,<br>tuberculocidă, fungicidă,<br>virucidă, sporicidă |
| Dezinfecția stofei de<br>culoare albă (lengeriei,<br>îmbrăcămintei de lucru<br>e.t.c) prin înmuire cu<br>clătire ulterioare.                         | 2-4g granule /10 L apă<br>sau<br>2 pastile / 10 L apă                      | 30 min                   | bactericidă,<br>tuberculocidă, fungicidă,<br>virucidă, sporicidă |
| Dezinfecția ouălelor prin<br>scufundare / înmuire cu<br>clătire ulterioare.                                                                          | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă                      | 15 min                   | bactericidă, fungicidă                                           |
| Utilajul de producere în<br>industria alimentară,<br>farmaceutică,<br>cosmetică cu clătire<br>ulterioară.                                            | 2 g granule / 10 L apă<br>sau<br>1 pastilă / 10 L apă                      | 5-10 min                 | bactericidă, fungicidă                                           |
| Urnă de gunoi<br>(deșeurile medicale)                                                                                                                | 4 g granule / 10 L apă<br>sau<br>2 pastile / 10 L apă                      | 30 min                   | bactericidă,<br>tuberculocidă, fungicidă,<br>virucidă, sporicidă |
| Barierelor pentru<br>dezinfecție la punctele de<br>trecere.                                                                                          | 4 g granule / 10 L apă<br>sau<br>2 pastile / 10 L apă                      | 30 min                   | bactericidă,<br>tuberculocidă, fungicidă,<br>virucidă, sporicidă |
| Apă potabilă.                                                                                                                                        | 1-2 g/1000 L apă<br>(1/2-1 pastilă /1000 L<br>apă)                         | 15-30 min                | bactericidă,<br>tuberculocidă, fungicidă,<br>virucidă, sporicidă |
| Dupa 30 min de la dezinfectai apei potabile se masoara concentratia clorului rezidual, prin metoda «MERK» (concentrația recomandată 0,3-1,2 mg / L). |                                                                            |                          |                                                                  |
| Doza initiala la implere cu<br>apa a bazinelor de inot                                                                                               | 6-8 g/1 m <sup>3</sup> apă<br>(3-4 pastile / 1 m <sup>3</sup> apă)         |                          | bactericidă,<br>tuberculocidă, fungicidă,<br>virucidă, sporicidă |
| Doza de mentinere a apei<br>in bazinele de inot                                                                                                      | 0,5-1 g/1 m <sup>3</sup> apă<br>(1/4-1/2 pastilă /1 m <sup>3</sup><br>apă) | de 2 ori pe zi<br>12 ore | bactericidă,<br>tuberculocidă, fungicidă,<br>virucidă, sporicidă |
| La 12 ore, concentrația recomandată a clorului rezidual (test «MEPK»):- 0,2-0,5 mg/L                                                                 |                                                                            |                          |                                                                  |

01/2012

Soluția de lucru se pregătește extempore. Termenul de valabilitate al soluției de lucru constituie 24 ore din momentul preparării.

**Măsuri de precauție:** în timpul pregătirii și utilizării soluției de lucru se vor folosi mănuși de cauciuc, în timpul efectuării dezinfecției și pe toată perioada de expunere este interzisă întrebuințarea produselor alimentare, fumatul.

La contact cu ochii, de spălat cu apă și de adresat la medic. În caz de incendiu de a nu inspira fumul.

**Transportarea:** se transportă prin intermediul mijloacelor de transport de tip închis, departe de mărfurile ușor inflamabile. Pentru persoanele ce transportă marfa nu sunt necesare măsuri de precauție.

**Păstrare:** se păstrează în ambalaj original, în încăperi bine aerisite cu un grad scăzut de umiditate, departe de obiecte ușor inflamabile, de căldură și razele solare.

De păstrat departe de copii.

**Indicațiile pentru neutralizarea resturilor preparatului și ambalajului:** resturile preparatului sub formă de pastile sau soluție de lucru și ambalajul se colectează într-un vas special închis ermetic după aceea se transmite persoanei responsabile pentru evacuarea deșeurilor.

**Ambalaje:** Granule - 1 kg; 5 kg gălătită din plastic, 450 g ambalaj plastic

Pastile 2,8 g - 4,5 kg gălătită din plastic, 450 g ambalaj plastic

Pastile efervescente - 1 kg; 4,5 kg gălătită din plastic, 420 g ambalaj plastic

Termen de valabilitate: 3 ani

