

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ЛП - 004951 - 230718

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гриппол® Квадривалент

Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная
адьювантная

Регистрационное удостоверение:

Торговое наименование: Гриппол® Квадривалент

Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная адьювантная

Группировочное наименование: Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная]
+ Азоксимера бромид

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного и подкожного введения

Состав на 1 дозу (0,5 мл):

Действующие вещества:

Антиген вируса гриппа типа А (H₁N₁)*

с содержанием гемагглютинина - 5 мкг

Антиген вируса гриппа типа А (H₃N₂)*

с содержанием гемагглютинина - 5 мкг

Антиген вируса гриппа типа В (линия Yamagata)*

с содержанием гемагглютинина - 5 мкг

Антиген вируса гриппа типа В (линия Victoria)*

с содержанием гемагглютинина - 5 мкг

Полиоксидоний®, субстанция-лиофилизат** (Азоксимера бромид) - 500 мкг

Вспомогательные вещества:

Фосфатно-солевой буферный раствор до 0,5 мл

Тиомерсал *** 50 мкг

* - штаммы антигенов вируса гриппа – в соответствии с рекомендациями ВОЗ на текущий эпидемический сезон для Северного полушария;

** - в пересчете на действующее вещество Азоксимера бромид, вспомогательные вещества – маннитол, повидон;

*** - консервант тиомерсал - только для многодозового флакона (10 доз - 5 мл во флаконе).

Примечания:

1. В составе фосфатно-солевого буферного раствора: калия хлорид, калия дигидрофосфат, динатрия гидрофосфат дигидрат, натрия хлорид, вода для инъекций.
2. В антигенах вируса гриппа в качестве вспомогательного вещества может присутствовать тритон X-100.

Описание

Бесцветная или с желтоватым оттенком слегка опалесцирующая жидкость.

Характеристика препарата

Вакцина представляет собой протективные антигены (гемагглютинин и нейраминидаза) эпидемически актуальных штаммов вирусов гриппа типа А подтипов A(H₁N₁), A(H₃N₂) и типа В линии Yamagata и линии Victoria, выделенные из вирусодержащей аллантоисной жидкости куриных эмбрионов, связанные с иммуноадьювантом Полиоксидоний® (МНН: Азоксимера бромид).

Штаммовый состав вакцины ежегодно обновляется в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ для Северного полушария.

Фармакотерапевтическая группа: МИБП-вакцина.

Код ATX: J07BB02.

Иммунологические свойства

Вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

Включение в вакцинный препарат иммуноадьюванта Полиоксидоний®, обладающего широким спектром иммунофармакологического действия, обеспечивает увеличение иммуногенности и стабильности антигенов, позволяет повысить иммунологическую память, существенно снизить прививочную дозу антигенов.

Показания к применению

Специфическая профилактика гриппа у людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Вакцина особенно показана:

1. Лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:

- лицам старше 60 лет;
- лицам, часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе: болезнями и пороками развития центральной нервной, сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, болезнями обмена веществ, аутоиммунными

заболеваниями, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам); хронической анемией, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, ВИЧ-инфицированным;

2. Лицам, по роду профессии имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им других лиц:

- медработникам, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, работникам образовательных учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта, торговли, полиции, занятых на предприятиях птицеводства, военнослужащим и др.

Противопоказания

- Аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины, включая тиомерсал, содержащийся в мультидозовых флаконах.
- Аллергические реакции на ранее вводимые гриппозные вакцины.
- Сильная реакция (температура выше 40 °С, отек и гиперемия в месте введения свыше 8 см в диаметре) или осложнения на предыдущее введение гриппозных вакцин в анамнезе.
- Острые лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии).
- При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры.
- Возраст до 18 лет.
- Период беременности (при применении вакцины, содержащей консервант тиомерсал).

С осторожностью

Не вводить внутривенно!

В кабинетах, где проводится вакцинация, необходимо иметь средства противошоковой терапии.

Вакцинированный должен находиться под наблюдением медработника в течение 30 мин после иммунизации.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Решение о вакцинации беременных должно приниматься врачом индивидуально с учетом риска заражения гриппом и возможных осложнений гриппозной инфекции. Наиболее безопасна вакцинация во втором и третьем триместрах.

Кормление грудью не является противопоказанием для вакцинации.

Способ применения и дозы

Вакцинация проводится ежегодно в осенне-зимний период. Возможна вакцинация в начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом.

Вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно в верхнюю треть наружной

поверхности плеча (в дельтовидную мышцу).

Дозировка для взрослых: 0,5 мл однократно.

Пациентам с иммунодефицитом и получающим иммуносупрессивную терапию возможно введение вакцины двукратно по 0,5 мл с интервалом 3-4 недели.

Перед применением вакцину следует выдержать до комнатной температуры и хорошо встряхнуть.

При использовании шприца необходимо снять защитную крышку с иглы и удалить воздух из шприца, удерживая его в вертикальном положении иглой вверх и медленно нажимая на поршень.

Вскрытие многодозового флакона осуществляют при строгом соблюдении правил асептики и антисептики. Перед вскрытием флакона внешнюю поверхность его пробки протирают ватой, смоченной 70% этиловым спиртом, набирают вакцину в шприц одноразового применения и удаляют из шприца избыток воздуха. Для каждой забранной дозы, для каждого пациента следует использовать новый стерильный шприц с новой стерильной иглой. В интервалах между заборами доз и не позднее, чем через 5 мин после последнего забора, флакон необходимо поместить в холодильник (но не в морозильную камеру) для хранения при температуре от 2 до 8 °C. Препарат во вскрытом многодозовом флаконе может использоваться в течение рабочего дня при соблюдении надлежащих правил хранения.

Частично использованный многодозовый флакон необходимо немедленно уничтожить в случаях:

- если нельзя гарантировать стерильность забора вакцины;
- вероятности или существования контаминации;
- изменения внешнего вида и наличия посторонних примесей.

Вакцина в многодозовом флаконе должна сохраняться в течение всего срока хранения в соответствии с рекомендациями производителя, указанными в инструкции о применении. После использования все остатки вакцины и упаковка должны быть уничтожены безопасным способом в соответствии с местными требованиями.

Побочное действие

Вакцина является высокоочищенным препаратом и хорошо переносится.

Частота развития побочных реакций, зарегистрированных при проведении клинических исследований, представлена в соответствие классификацией ВОЗ НЛР.

Частота развития нежелательных реакций по классификации ВОЗ: очень частые (>1/10), частые (>1/100 и <1/10), нечастые (>1/1000 и <1/100), редкие (>1/10000 и <1/1000), очень редкие (<1/10000).

Со стороны крови и лимфатической системы: редко – увеличение лимфатических узлов.

Со стороны нервной системы: часто – головная боль.

Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто – насморк, покраснение горла, нечасто – боль в горле.

Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: нечасто – миалгия, артрит.

Общие расстройства и нарушения в месте введения:

- общие расстройства: часто – недомогание;

- местные расстройства: очень часто – боль, покраснение, образование уплотнений (инфилтратии) и припухлость в месте введения, часто – зуд в месте введения.

Лабораторные и инструментальные данные: нечасто – повышение температуры тела.

Большинство реакций обычно проходят самостоятельно в течение 2-3 суток.

Несмотря на отсутствие клинических данных, нельзя исключить возможность развития характерных для гриппозных вакцин неврологических расстройств и аллергических реакций (в том числе реакции немедленного типа, на куриный белок и другие компоненты вакцины).

Пациент должен быть проинформирован о необходимости сообщить врачу о любых выраженных или не указанных в данной инструкции побочных реакциях.

Передозировка

Случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Гриппол® Квадривалент Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная адьюванная может применяться одновременно с инактивированными и живыми вакцинами национального календаря профилактических прививок (за исключением БЦЖ и БЦЖ-М) и инактивированными вакцинами календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (за исключением антирабических). При этом должны учитываться противопоказания к каждой из применяемой вакцин; препараты следует вводить в разные участки тела разными шприцами.

Вакцина может вводиться на фоне базисной терапии, имеющейся у прививаемого заболевания. Вакцинация пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию (глюкокортикоиды, цитостатические препараты, радиотерапия), может быть менее эффективной.

Особые указания

В день прививки вакцинируемые должны быть осмотрены врачом (фельдшером) с обязательной термометрией. При температуре выше 37,0 °C вакцинацию не проводят.

Не пригоден к применению препарат в шприцах с нарушенной целостностью или маркировкой, при изменении физических свойств (цвета, прозрачности), при истекшем сроке годности, нарушении требований к условиям хранения.

Несоблюдение техники забора доз из многодозового флакона может оказаться на свойствах препарата. По этой причине производитель несет ответственность за его качество в течение 24 часов после первой процедуры забора только при условии хранения в холодильнике в соответствии с рекомендациями производителя.

Многодозовые флаконы Гриппол® Квадривалент содержат в качестве консерванта небольшое количество тиомерсала, который может быть причиной аллергической реакции.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Гриппол® Квадривалент Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная адьювантная не оказывает влияния на способность к вождению автомобиля или управление машинами и механизмами.

Форма выпуска

Раствор для внутримышечного и подкожного введения.

По 0,5 мл (1 доза) в шприцы одноразового применения из стекла.

По 5,0 мл (10 доз) с консервантом во флаконы из стекла, герметично укупоренные резиновыми пробками и обжатые алюминиевыми колпачками.

По 1, 5 или 10 шприцев в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной, покрытой фольгой алюминиевой с полимерным покрытием.

По 1 (содержащей 1 или 5 шприцев или 10 шприцев) или 2 (содержащих 5 шприцев) контурные ячейковые упаковки в пачку из картона вместе с инструкцией по применению.

По 1 флакону в пачку из картона вместе с инструкцией по применению.

По 20 или 50 флаконов в пачку из картона со вставкой из картона вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать. Препарат, подвергшийся замораживанию, применению не подлежит.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия транспортирования

В защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °C. Не замораживать.

Допускается транспортирование при температуре не выше 25 °C не более 24 часов.

Срок годности

1 год. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Упаковка, содержащая 1 шприц, отпускается по рецепту.

Упаковка, содержащая 5 или 10 шприцев, 1, 20 или 50 флаконов отпускается лечебно-профилактическим учреждениям.

Производитель

ООО «НПО Петровакс Фарм»

Российская Федерация, 142143, Московская обл., г. Подольск, с. Покров, ул. Сосновая, д. 1, тел./факс: +7(495) 926-21-07, e-mail: info@petrovax.ru

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителя:

ООО «НПО Петровакс Фарм»

Юридический адрес / Адрес для предъявления претензий потребителей:

Российская Федерация, 142143, Московская обл., г. Подольск, с. Покров, ул. Сосновая, д. 1, тел./факс: +7(495) 926-21-07, e-mail: info@petrovax.ru

Рекламации на качество препарата по физическим свойствам, фасовке, упаковке и информацию о случаях повышенной реактогенности или развития постvakцинальных осложнений с обязательным указанием номера серии и даты изготовления с последующим представлением медицинской документации направлять в адрес предприятия-производителя ООО «НПО Петровакс Фарм»: e-mail: adr@petrovax.ru

Руководитель по регистрации в России и ЕАЭС
ООО «НПО Петровакс Фарм»



— М.П. Носырева

Прощито и пронумеровано
и скреплено печатью 4 листа(ов)
Представитель ^{тестоте}
ООО «НПО Петровакс Фарм»

«15 » июня 2018 года

О.А. Краева

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-004951 - 230718
СОГЛАСОВАНО



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Гриппол® Квадривалент

Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная
адьювантная

Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] + Азоксимера бромид

раствор для внутримышечного и подкожного введения

ООО «НПО Петровакс Фарм», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « » 12 04 19 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Показания к применению</p> <p>Специфическая профилактика гриппа у людей в возрасте от 18 до 60 лет.</p> <p>Вакцина особенно показана:</p> <p>1. Лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лицам старше 60 лет; - лицам, часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе: болезнями и пороками развития центральной нервной, сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, болезнями обмена веществ, аутоиммунными заболеваниями, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам); хронической анемией, врожденным или приобретенным 	<p>Показания к применению</p> <p>Специфическая профилактика гриппа у людей в возрасте от 18 до 60 лет.</p> <p>Вакцинация особенно показана:</p> <p>1. Лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лицам, часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе: болезнями и пороками развития центральной нервной, сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, болезнями обмена веществ, аутоиммунными заболеваниями, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам); хронической анемией, врожденным или приобретенным

Старая редакция	Новая редакция
<p>анемией, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, ВИЧ-инфицированным;</p> <p><i>2. Лицам, по роду профессии имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им других лиц:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - медработникам, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, работникам образовательных учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта, торговли, полиции, занятым на предприятиях птицеводства, военнослужащим и др. 	<p>иммунодефицитом, лицам старше 60 лет, ВИЧ-инфицированным;</p> <p><i>2. Лицам, по роду профессии имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им других лиц:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - медработникам, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, работникам образовательных учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта, торговли, полиции, занятым на предприятиях птицеводства, военнослужащим и др.
<p>Побочное действие</p> <p>Вакцина является высокоочищенным препаратом и хорошо переносится.</p> <p>Частота развития побочных реакций, зарегистрированных при проведении клинических исследований, представлена в соответствие классификацией ВОЗ НЛР.</p> <p>Частота развития нежелательных реакций по классификации ВОЗ: очень частые ($>1/10$), частые ($>1/100$ и $<1/10$), нечастые ($>1/1000$ и $<1/100$), редкие ($>1/10000$ и $<1/1000$), очень редкие ($<1/10000$).</p> <p>Со стороны крови и лимфатической системы: редко – увеличение лимфатических узлов.</p> <p>Со стороны нервной системы: часто – головная боль.</p> <p>Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто – насморк, покраснение горла, нечасто – боль в горле.</p>	<p>Побочное действие</p> <p>Вакцина является высокоочищенным препаратом и хорошо переносится.</p> <p>Частота развития побочных реакций, зарегистрированных при проведении клинических исследований, представлена в соответствии с классификацией ВОЗ НЛР.</p> <p>Частота развития нежелательных реакций по классификации ВОЗ: очень частые ($>1/10$), частые ($>1/100$ и $<1/10$), нечастые ($>1/1000$ и $<1/100$), редкие ($>1/10000$ и $<1/1000$), очень редкие ($<1/10000$).</p> <p>Со стороны крови и лимфатической системы: редко – увеличение лимфатических узлов.</p> <p>Со стороны нервной системы: часто – головная боль.</p> <p>Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто – насморк, покраснение горла, нечасто – боль в горле.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: нечасто – миалгия, артralгия.</p> <p>Общие расстройства и нарушения в месте введения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общие расстройства: часто – недомогание; - местные расстройства: очень часто – боль, покраснение, образование уплотнений (инфилтратии) и припухлость в месте введения, часто – зуд в месте введения. <p>Лабораторные и инструментальные данные: нечасто – повышение температуры тела.</p> <p>Большинство реакций обычно проходят самостоятельно в течение 2-3 суток.</p> <p>Несмотря на отсутствие клинических данных, нельзя исключить возможность развития характерных для гриппозных вакцин неврологических расстройств и аллергических реакций (в том числе реакции немедленного типа, на куриный белок и другие компоненты вакцины).</p> <p>Пациент должен быть проинформирован о необходимости сообщить врачу о любых выраженных или не указанных в данной инструкции побочных реакциях.</p>	<p>Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: нечасто – миалгия, артralгия.</p> <p>Общие расстройства и нарушения в месте введения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общие расстройства: часто – недомогание; - местные расстройства: очень часто – боль, покраснение, образование уплотнений (инфилтратии) и припухлость в месте введения, часто – зуд в месте введения. <p>Лабораторные и инструментальные данные: нечасто – повышение температуры тела.</p> <p>Большинство реакций обычно проходят самостоятельно в течение 2-3 суток.</p> <p>Несмотря на отсутствие клинических данных, нельзя исключить возможность развития характерных для гриппозных вакцин неврологических расстройств и аллергических реакций (в том числе реакции немедленного типа, на куриный белок и другие компоненты вакцины).</p> <p>Пациент должен быть проинформирован о необходимости сообщить врачу о любых выраженных или не указанных в данной инструкции побочных реакциях.</p>
<p>Форма выпуска</p> <p>Раствор для внутримышечного и подкожного введения.</p> <p>По 0,5 мл (1 доза) в шприцы одноразового применения из стекла.</p> <p>По 5,0 мл (10 доз) с консервантом во флаконы из стекла, герметично укупоренные резиновыми пробками и</p>	<p>Форма выпуска</p> <p>Раствор для внутримышечного и подкожного введения.</p> <p>По 0,5 мл (1 доза) в шприцы одноразового применения из стекла.</p> <p>По 5,0 мл (10 доз) с консервантом во флаконы из стекла, герметично укупоренные резиновыми пробками и</p>

Старая редакция	Новая редакция
обжатые алюминиевыми колпачками. По 1, 5 или 10 шприцев в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной, покрытой фольгой алюминиевой с полимерным покрытием. По 1 (содержащей 1 или 5 шприцев или 10 шприцев) или 2 (содержащих 5 шприцев) контурные ячейковые упаковки в пачку из картона вместе с инструкцией по применению. По 1 флакону в пачку из картона вместе с инструкцией по применению. По 20 или 50 флаконов в пачку из картона со вставкой из картона вместе с инструкцией по применению.	обжатые алюминиевыми колпачками. По 1, 5 или 10 шприцев в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной, покрытой фольгой алюминиевой с полимерным покрытием. По 1 (содержащей 1 или 5 шприцев или 10 шприцев) или 2 (содержащих 5 шприцев) контурные ячейковые упаковки в пачку из картона вместе с инструкцией по применению. По 1 флакону в пачку из картона вместе с инструкцией по применению. По 10, 20 или 50 флаконов в пачку из картона со вставкой из картона вместе с инструкцией по применению.
Условия отпуска Упаковка, содержащая 1 шприц, отпускается по рецепту. Упаковка, содержащая 5 или 10 шприцев, 1, 20 или 50 флаконов отпускается лечебно-профилактическим учреждениям.	Условия отпуска Упаковка, содержащая 1 шприц, отпускается по рецепту. Упаковка, содержащая 5 или 10 шприцев, 1, 10, 20 или 50 флаконов отпускается лечебно-профилактическим учреждениям.

Руководитель по регистрации в России и ЕАЭС
ООО «НПО Петровакс Фарм»

М.П. Носырева



Пропито и пронумеровано
и скреплено печатью С Представитель
ООО «НПО Петровакс Фарм»
Санкт-Петербург



МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛМ-004951- 22 08 19

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Гриппол® Квадривалент

Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная
адьюванная

Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] + Азоксимера бромид

раствор для внутримышечного и подкожного введения

ООО «НПО Петровакс Фарм», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » 22 08 19 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Показания к применению</p> <p>Специфическая профилактика гриппа у людей в возрасте от 18 до 60 лет.</p> <p>Вакцинация особенно показана:</p> <p>1. <i>Лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:</i></p> <p>- лицам, часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе: болезнями и пороками развития центральной нервной,</p>	<p>Показания к применению</p> <p>Специфическая профилактика гриппа у детей с 6 лет, подростков и взрослых до 60 лет.</p> <p>Для вакцинации детей от 6 до 18 лет используется вакцина без консерванта.</p> <p>Вакцинация особенно показана:</p> <p>1. <i>Лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:</i></p> <p>- лицам, часто болеющим ОРЗ,</p>

МИНЗДРАВ РОССИИ

ММ-004951- 22 08 19

СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Гриппол® Квадривалент

Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная
адьювантная

Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] + Азоксимера бромид

раствор для внутримышечного и подкожного введения

ООО «НПО Петровакс Фарм», Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » 22 08 19 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Показания к применению</p> <p>Специфическая профилактика гриппа у людей в возрасте от 18 до 60 лет.</p> <p>Вакцинация особенно показана:</p> <p>1. <i>Лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:</i></p> <p>- лицам, часто болеющим ОРЗ, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе: болезнями и пороками развития центральной нервной,</p>	<p>Показания к применению</p> <p>Специфическая профилактика гриппа у детей с 6 лет, подростков и взрослых до 60 лет.</p> <p>Для вакцинации детей от 6 до 18 лет используется вакцина без консерванта.</p> <p>Вакцинация особенно показана:</p> <p>1. <i>Лицам с высоким риском возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:</i></p> <p>- лицам, часто болеющим ОРЗ,</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, болезнями обмена веществ, аутоиммунными заболеваниями, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам); хронической анемией, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, лицам старше 60 лет ВИЧ-инфицированным;</p> <p><i>2. Лицам, по роду профессии имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им других лиц:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - медработникам, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, работникам образовательных учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта, торговли, полиции, занятым на предприятиях птицеводства, военнослужащим и др. 	<p>страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе: болезнями и пороками развития центральной нервной, сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, сахарным диабетом, болезнями обмена веществ, аутоиммунными заболеваниями, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам); хронической анемией, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, ВИЧ-инфицированным;</p> <p><i>2. Лицам, по роду профессии имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им других лиц:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - медработникам, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, работникам образовательных учреждений, сферы социального обслуживания, транспорта, торговли, полиции, занятым на предприятиях птицеводства, военнослужащим и др.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Противопоказания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины, включая тиомерсал, содержащийся в мультидозовых флаконах. - Аллергические реакции на ранее вводимые гриппозные вакцины. - Сильная реакция (температура выше 40 °C, отек и гиперемия в месте введения свыше 8 см в диаметре) или осложнения на предыдущее введение гриппозных вакцин в анамнезе. - Острые лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии). - При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры. - Возраст до 18 лет. - Период беременности (при применении вакцины, содержащей консервант тиомерсал). 	<p>Противопоказания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины, включая тиомерсал, содержащийся в мультидозовых флаконах. - Аллергические реакции на ранее вводимые гриппозные вакцины. - Сильная реакция (температура выше 40 °C, отек и гиперемия в месте введения свыше 8 см в диаметре) или осложнения на предыдущее введение гриппозных вакцин в анамнезе. - Острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний – прививки проводят через 2-4 недели после выздоровления или в период реконвалесценции или ремиссии. - При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры. - Детский возраст до 6 лет. - Возраст до 18 лет (при применении вакцины, содержащей консервант

Старая редакция	Новая редакция
	<p>тиомерсал).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Период беременности (при применении вакцины, содержащей консервант тиомерсал).
<p>Способ применения и дозы</p> <p>Вакцинация проводится ежегодно в осенне-зимний период. Возможна вакцинация в начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом.</p> <p>Вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (в дельтовидную мышцу).</p> <p>Дозировка для взрослых: 0,5 мл однократно.</p>	<p>Способ применения и дозы</p> <p>Вакцинация проводится ежегодно в осенне-зимний период. Возможна вакцинация в начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом.</p> <p>Вакцину вводят внутримышечно или глубоко подкожно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (в дельтовидную мышцу).</p> <p>Дозировка для детей от 6 лет, подростков и взрослых: 0,5 мл однократно.</p>
<p>Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителя:</p> <p>ООО «НПО Петровакс Фарм»</p> <p>Юридический адрес / Адрес для предъявления претензий потребителей:</p> <p>Российская Федерация, 142143, Московская обл., г. Подольск, с.</p>	<p>Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителя:</p> <p>ООО «НПО Петровакс Фарм»</p> <p>Юридический адрес / Адрес для предъявления претензий потребителей:</p> <p>Российская Федерация, 142143, Московская обл., г. Подольск, с.</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Покров, ул. Сосновая, д. 1, тел./факс: +7(495) 926-21-07, e-mail: info@petrovax.ru</p> <p>Рекламации на качество препарата по физическим свойствам, фасовке, упаковке и информацию о случаях повышенной реактогенности или развития поставки национальных осложнений с обязательным указанием номера серии и даты изготовления с последующим представлением медицинской документации направлять в адрес предприятия-производителя ООО «НПО Петровакс Фарм»: e-mail: adr@petrovax.ru</p>	<p>Покров, ул. Сосновая, д. 1, тел.: 8 800 234-44-80, +7(495) 730-75-45, тел./факс: +7(495) 926-21-07, e-mail: info@petrovax.ru</p> <p>Рекламации на качество препарата по физическим свойствам, фасовке, упаковке и информацию о побочном действии, случаях повышенной реактогенности или развития поставки национальных осложнений с обязательным указанием номера серии и даты изготовления с последующим представлением медицинской документации направлять в адрес предприятия-производителя ООО «НПО Петровакс Фарм»: e-mail: adr@petrovax.ru</p>

Директор по разработке, исследованиям
и регистрации лекарственных препаратов
в Российской Федерации и за рубежом
ООО «НПО Петровакс Фарм»



Н.Г. Гордеева

Прошито и пронумеровано
и скреплено печатью  листа(ов).

Представитель	ООО «НПО Петровакс Фарму
Согласовано	Н.Е. Назарова
» 20	2019 г.
Министерство здравоохранения Российской Федерации	
«НПО Петровакс Фарму»	
г. Москва	
Департамент по регистрации лекарственных средств	
Московской области	

Минздрав России
АИ-004951-
22.08.19
Согласовано
Н.Е. Назарова
» 20.08.2019 г.
Министерство здравоохранения Российской Федерации
«НПО Петровакс Фарму»
г. Москва
Департамент по регистрации лекарственных средств
Московской области

